

În septembrie, nu se preconizează precipitații de semnificație agricolă, iar condițiile vor permite formarea unei producții suplimentare din culturile legumicole târzii.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.09.2025 Брой: 9/2025



În septembrie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi peste normele climatice și precipitații în jurul și sub norma lunară.

După seceta în adâncime, precipitațiile de la sfârșitul lunii august au fost locale și doar în anumite locuri din regiunile centrale și de est au umezit stratul

superior al solului. În majoritatea regiunilor arabile, umiditatea productivă este absentă în straturile de sol de 50 și 100 cm.

În primele două decade ale lunii septembrie, nu sunt prevăzute precipitații de semnificație agronomică, iar în multe locuri din regiunile arabile, solul uscat și compactat va îngreuna executarea arăturii adânci și a pregătirii pre-semănat a suprafețelor destinate semănatului cu rapiță. Probabilitatea unor întârzieri serioase în semănarea acestei culturi oleaginoase, care necesită agrotehnică precisă, este mare. Perioada agrotehnică pentru semănatul rapiței este de la sfârșitul lunii august până la sfârșitul celei de-a doua decade a lunii septembrie.



În septembrie, condițiile termice peste normă prevăzute vor accelera etapele finale de dezvoltare ale culturilor agricole târzii care au depășit efectele adverse ale secetei prelungite de vară. La începutul lunii, hibrizii de porumb semi-târzii cultivați în condiții de irigație vor fi în faza de coacere cearoasă și deplină, în timp ce hibrizii târzii vor fi în tranziție de la coacerea lăptoasă la cea cearoasă.

În majoritatea zilelor lunii, vremea relativ uscată și caldă prevăzută pentru sfârșitul verii și începutul toamnei va oferi condiții potrivite pentru recoltarea strugurilor. Ca urmare a temperaturilor de vară peste normă, soiurile târzii de struguri pentru vin vor atinge maturitatea tehnologică mai devreme decât datele obișnuite.

Condițiile meteorologice din septembrie vor limita dezvoltarea bolilor fungice, cu excepția făinăriilor. Pentru culturile legumicole din producția târzie în câmp deschis, pulverizările de protecție a plantelor împotriva acarienilor, moliei verzei și viermelui capsiei, care provoacă daune și deteriorează calitatea recoltei legumicole, nu trebuie subestimate.

Pe parcursul lunii, activitatea dăunătoare a unei mari părți a dăunătorilor la culturile pomicole se încheie. La sfârșitul lunii septembrie, este recomandabil să se inspecteze livezile de peri pentru prezența gândacului mugurilor de păr. Combaterea acestui dăunător este eficientă doar împotriva adulților la începutul toamnei. Când densitatea dăunătorului depășește pragul economic de dăunătoritate (3 gândaci pe pom), tratamentul trebuie efectuat.

Ca urmare a temperaturilor de vară peste normă, o parte din soiurile timpurii de toamnă de pomi fructiferi, neafectate de înghețurile de primăvară, vor atinge maturitatea de recoltare (mere: Golden Parmena, Jonathan, Red Delicious, Golden Delicious, Canadian Reinette, etc.).

În septembrie, nu sunt prevăzute temperaturi minime critice, iar condițiile vor permite formarea de producție suplimentară de la culturile legumicole târzii sensibile la îngheț.