

Octombrie – Anomalii Climatice și un Început Întârziat de Toamnă Semănatul Culturilor Cerealiere de Iarnă

Автор(и): Растителна защита

Дата: 12.10.2025 Брой: 10/2025



În primele zece zile ale lunii octombrie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de vreme instabilă și temperaturi medii zilnice în jurul și sub normele climatice. În această perioadă de zece zile, nu sunt prognozate temperaturi minime critice pentru culturile de legume cu producție târzie în zonele de câmp, ceea ce reprezintă o condiție prealabilă pentru recoltarea de produse suplimentare de la culturile sensibile la îngheț (roșii, ardei, dovlecei, castraveți murați etc.).

În această perioadă, sunt prognozate precipitații semnificative din punct de vedere economic, îmbunătățind starea straturilor superioare ale solului și condițiile pentru efectuarea lucrărilor sezoniere ale solului. Seceta de la sfârșitul verii și începutul toamnei în multe părți ale țării a împiedicat cultivarea pre-semănat a suprafețelor destinate culturilor de toamnă.

Precipitațiile abundente din primele zece zile ale lunii octombrie, care în multe locuri din țară au depășit de două ori, iar în nordul Bulgariei – de trei ori normele climatice: Lovech - 152 l/m² (296%), Pleven - 167 l/m² (342%), V. Tarnovo - 187 l/m² (351%), Razgrad - 171 l/m² (302%), Ruse - 254 l/m² (450%), au suprasaturat straturile superioare ale solului și au crescut rezervele de umiditate în straturile de 50 și 100 cm.

Începutul Semănatului de Toamnă



Condițiile agrometeorologice nefavorabile – seceta și precipitațiile excesive ulterioare din primele zece zile ale lunii octombrie au împiedicat lucrările sezoniere ale solului, iar în unele regiuni ale țării, cum ar fi Bulgaria de Vest, semănatul culturilor cerealiere de iarnă este întârziat, deși startul oficial al semănatului de toamnă a fost deja dat.

Primele zece zile ale lunii octombrie reprezintă termenul agrotehnic pentru semănatul grâului în nordul Bulgariei, de la 15 la 25.X - în sudul Bulgariei, iar la sfârșitul lunii - în regiunile de coastă ale Mării Negre. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii și Alimentației, semănatul grâului este în întârziere cu peste 52%, cu suprafețe mai mici

semănite în țară comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Se observă o întârziere și pentru orz și secară, dar într-o măsură mai mică.

Posibilități de Utilizare și Aplicare a Triticalei

Conform datelor Ministerului Agriculturii și Alimentației, se observă o creștere semnificativă a suprafețelor cultivate cu triticale în campania de semănat de toamnă din acest an – cu aproape 54% mai mult comparativ cu un an anterior. În 2024, suprafețele cu această cultură erau de 102 xa în acest moment al anului, în timp ce în prezent, câmpurile semănite cu triticale sunt de 167 xa.

Interesul pentru această cultură, care este un hibrid intergeneric de grâu și secară, a crescut în ultimii ani datorită combinației dintre potențialul ridicat de producție al grâului și rezistența la boli a secarei.



O tendință cunoscută de creștere a suprafețelor cultivate cu rapiță a fost observată în ultimele câteva sezoane. Anul acesta, creșterea culturii în timpul semănatului de toamnă este de 39% comparativ cu datele campaniei de anul trecut. Până astăzi, câmpurile semănite cu rapiță depășesc 73,3 mii hectare.

În majoritatea zilelor din a doua și a treia decadă, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de o vreme relativ uscată și temperaturi apropiate de normal. Există o probabilitate ridicată ca fazele inițiale de vegetație

pentru culturile cerealiere de iarnă semănate la sfârșitul lunii octombrie să se desfășoare cu deficit de umiditate. La sfârșitul lunii, pentru grâu și orz, în funcție de datele de semănat, se vor observa fazele de răsărire și formare a 1-2 frunze.

În această perioadă, condițiile vor fi favorabile pentru finalizarea recoltării strugurilor, pentru recoltarea soiurilor de toamnă de pomi fructiferi, iar la sfârșitul lunii octombrie – și pentru desfășurarea activităților fitosanitare.

Pentru livezile de măr și păr afectate de rapăn, pentru a reduce infecția, este recomandabil să se trateze cu o soluție de uree 5% la începutul căderii frunzelor, după recoltarea fructelor.

Pentru speciile de sâmburoase, după căderea masivă a frunzelor, se recomandă pulverizarea cu o soluție Bordeleză 2% împotriva agenților patogeni ai ciuruirii frunzelor, moniliozei timpurii, bășicării frunzelor de piersic etc.