

În a doua jumătate a lunii noiembrie, vor exista condiții pentru desfășurarea activităților agrotehnice sezoniere și plantarea pomilor fructiferi.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 09.11.2025 Брой: 11/2025



Condițiile agrometeorologice din noiembrie vor fi determinate de temperaturi apropiate și peste normele climatice și precipitații în jurul și sub norma pentru lună.

Până la sfârșitul primei și începutul celei de-a doua decade a lunii noiembrie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de o vreme instabilă. Precipitațiile de la sfârșitul perioadei de șapte zile trecute și cele așteptate în

următoarea vor întârzia și mai mult, dincolo de termenele agrotehnice, semănatul grâului. Până în prezent, au fost semănat aproximativ jumătate din suprafețele planificate.

Precipitațiile din octombrie, care au depășit normele climatice de două-trei ori (Sofia, Pleven, Lovech, V. Tarnovo, Razgrad, Ruse, Pazardzhik, Stara Zagora, Burgas), au menținut un conținut ridicat de umiditate în straturile superioare ale solului, ceea ce a întârziat lucrările de pregătire a patului germinativ și semănatul cerealelor de toamnă. Din acest motiv obiectiv, în majoritatea zonelor țării, cu excepția unor suprafețe din Câmpia Dunării și din regiunile estice, termenele agrotehnice pentru semănatul grâului în octombrie au fost ratate. O parte semnificativă din suprafețele planificate pentru cerealele de toamnă vor fi semănat în noiembrie. Există o probabilitate ridicată ca culturile semănat în noiembrie să nu poată intra în faza de înfrățire, faza potrivită pentru iernare, până la sfârșitul vegetației lor de toamnă.

În majoritatea zilelor lunii noiembrie, sunt prognozate temperaturi medii zilnice peste normal, ceea ce va menține procesele de vegetație active la culturile de toamnă. La sfârșitul lunii, se vor observa diferite faze la grâu și orz, în funcție de datele de semănat. Pentru culturile semănat în noiembrie, vor apărea germinația și formarea frunzelor (1-2-3 frunze). Într-o mică parte din culturile de grâu din unele zone ale Câmpiei Dunării și din regiunile estice (Dobrich, General Toshevo, Tervel, Provadia, Karnobat), care au fost semănat la începutul toamnei, se va observa începutul fazei de înfrățire.



*Cel mai periculos dăunător al culturilor cerealiere este cărticelul cerealelor (*Zabrus tenebrioides*), care atacă grâul, orzul, porumbul, ovăzul și o serie de graminee cerealiere.*

În fazele inițiale de vegetație a grâului și orzului, culturile ar trebui monitorizate pentru dăunători. Daunele sunt cauzate de șoarecele de câmp, larvele cărticelului cerealelor și muștele cerealelor, iar dacă densitatea este peste NDE (Nivelul Daunei Economice), este necesară o protecție fitosanitară la timp.



În noiembrie, condiții mai prielnice pentru plantarea pomilor fructiferi și pentru efectuarea activităților fitosanitare la culturile pomicole vor fi create în a doua decadă. Pentru speciile de fructe semănțoase (măr, păr) afectate de rapăn, se recomandă tratamentul cu o soluție de uree 5%. Pentru speciile de fructe sâmburoase, este indicat să se pulverizeze cu o soluție Bordeleză 2% împotriva agenților patogeni ai ciuruirii frunzelor, moniliozei și a bășicării frunzelor de piersic.