

Decembrie – temperaturi neobișnuit de ridicate și precipitații localizate

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.12.2025 Брой: 12/2025



Vremea caldă pentru sezon în cea mai mare parte a lunii noiembrie și prezența unor rezerve foarte bune de umiditate în sol au creat condiții pentru progresul în dezvoltarea culturilor de toamnă semănate târziu, după termenele agro-tehnice.

La începutul lunii decembrie, temperaturile prognozate peste normal vor prelungi procesele de vegetație ale cerealelor de iarnă din regiunile agricole ale țării.

Precipitațiile extinse la începutul perioadei vor crește nivelul rezervelor de umiditate de toamnă în stratul de sol de 100 cm. Datorită precipitațiilor peste normal din octombrie și noiembrie, rezervele de umiditate în stratul de

un metru pentru cerealele de iarnă în majoritatea regiunilor agricole au atins niveluri de până la 90% din CC (capacitatea de câmp).

La sfârșitul perioadei de zece zile, condițiile agrometeorologice vor continua să fie determinate de temperaturi ridicate pentru sezon. În regiunile estice, sunt prognozate valori maxime de peste 14-15°C, cu o probabilitate de a provoca umflarea nedorită, prematură a mugurilor la unele specii de fructe cu înflorire timpurie, ceea ce ar duce la o reducere a rezistenței acestora la îngheț.

Condiții favorabile pentru finalizarea stropirilor de toamnă pentru protecția plantelor la pomii fructiferi împotriva patogenilor și dăunătorilor care iernează vor fi create în a doua jumătate a primei decade a lunii.

O scădere a temperaturilor, atenuarea și încetarea vegetației pentru grâu și orz sunt așteptate la sfârșitul primei decade a lunii decembrie.

În a doua și începutul celei de-a treia decade, temperaturile medii zilnice prognozate vor depăși normele climatice, dar vor rămâne în limite care vor menține cerealele de iarnă în repaus vegetativ.

La începutul iernii, stadiul de a treia frunză va predomina pentru grâu. O mică parte din culturile din unele regiuni estice și sudice îndepărtate ale țării, care au fost semănate la timp - în octombrie, se vor afla în faza de înfrățire, potrivită pentru iernare. Cerealele de iarnă semănate târziu, în a doua jumătate a lunii noiembrie, vor intra în iarnă nedezvoltate, în stadiul inițial de formare a frunzelor (1-2 frunze). Motivul diferențelor semnificative în starea fenologică a culturilor este semănatul întârziat din cauza condițiilor nefavorabile de la începutul toamnei – după secetă și ploile ulterioare peste normal din octombrie.

Spre sfârșitul lunii decembrie, este așteptată o creștere a temperaturilor, dar valorile lor medii zilnice vor rămâne sub minimul biologic necesar pentru reluarea proceselor de vegetație la culturile de toamnă.

Pe parcursul lunii, temperaturile minime prognozate, de până la minus 10°C, în condiții fără strat de zăpadă, dacă se mențin o perioadă mai lungă, vor fi critice pentru culturile aflate în stadiul inițial de formare a frunzelor.

Precipitațiile așteptate în decembrie, aproape de norma lunară, vor crește rezervele de umiditate în stratul de sol de 100 cm la niveluri apropiate de CC (capacitatea de câmp).

