

Ianuarie – condițiile agrometeorologice vor fi determinate de vremea dinamică cu precipitații semnificative

Автор(и): Растителна защита

Дата: 31.12.2025 Брой: 12/2025



În ianuarie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de o vreme dinamică, cu alternarea unor perioade cu temperaturi subnormale, peste normal și apropiate de normele climatice.

Valorile medii zilnice prognozate în majoritatea regiunilor agricole se vor încadra în limite care vor menține culturile de toamnă și plantațiile perene în repaus vegetativ. Excepții se așteaptă în regiunile sudice și de-a lungul litoralului Mării Negre la mijlocul primei decade. În aceste regiuni, se prevede o creștere semnificativă a

temperaturilor până la și peste 10-15°C și o reluare pe termen scurt a proceselor de vegetație la culturile cerealiere de iarnă, dar acestea nu vor duce la o modificare a stării fenologice a culturilor.

În ianuarie, grâul va ierna în diferite faze fenologice. Predomină culturile aflate în faza a treia a frunzei. În faza de înfrățire, faza potrivită pentru iernare, se află culturile cerealiere de iarnă în părți din regiunile de est și sud-vest ale țării (Silistra, Provadia, Dolen Chiflik, Karnobat și Sandanski). Pe alocuri, în nord-vestul Bulgariei, la stația agricolă Nikolaevo, culturile se află în faza de germinație și formare inițială a frunzelor. Acestea nu sunt puternice și vor fi cel mai vulnerabile la impactul temperaturilor scăzute din ianuarie. Valorile minime prognozate, în ordine de minus 15 - 18°C, în condiții fără strat de zăpadă și durată prelungită, vor fi critice pentru culturile cerealiere de iarnă care nu au înfrățit. Valori sub minus 16 - 17°C vor fi, de asemenea, periculoase pentru mugurii soiurilor de struguri de masă mai puțin rezistente la frig.

Pe parcursul lunii, precipitațiile așteptate, apropiate de normele climatice, vor crește rezervele de umiditate din sol în straturile de un metru și doi metri. La începutul iernii, nivelul rezervelor de umiditate în stratul de sol de 100 cm pentru culturile de toamnă în majoritatea regiunilor agricole este foarte bun – peste 90% din capacitatea de câmp.