

În prima decadă a lunii martie, conținutul ridicat de umiditate din straturile superioare ale solului va împiedica semănatul culturilor de primăvară timpurii.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.03.2026 *Брой:* 3/2026



În prima decadă a lunii martie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi peste media. Vremea caldă prognozată la începutul lunii, cu valori maxime peste 15-16°C, va activa procesele vegetative la culturile semănate toamna și la culturile pomicele din regiunile de câmpie ale țării. În această perioadă, în culturile de grâu din regiunile nord-vestice va predomina faza celei de-a treia frunze, în timp ce în regiunile estice și sudice va domina faza de încălțare.

La culturile pomicole, fără pericolul temperaturilor minime critice, în speciile cu floare timpurie de sămbure din regiunile sudice vor avea loc fazele de umflare a mugurilor și de deschidere a mugurilor.

Nu se așteaptă precipitații semnificative în perioadă. Datorită precipitațiilor peste medie din februarie, rezervele de umiditate din sol din stratul de 100cm în majoritatea regiunilor de câmpie au atins niveluri până la Capacitatea de Câmp. În unele părți ale regiunilor sudice, unde precipitațiile au depășit normele lunare de două până la trei ori (Sliven -111l/m², St. Zagora - 130l/m², Haskovo - 155l/m², Kardjali - 150l/m², Elhovo - 121l/m², Șirpan - 118l/m²), culturile de cereale de toamnă sunt supra-umezite.



Și în perioada următoare, conținutul ridicat de umiditate din straturile superioare ale solului în multe locuri din sudul Bulgariei va îngreuna fertilizarea de susținere a culturilor semănate toamna cu îngrășăminte minerale azotate și efectuarea lucrărilor de pregătire pre-semănat pe suprafețele destinate semănatului cu culturi de primăvară timpurii (măzărache, mazăre, orz de primăvară).

După răcirea scurtă așteptată la sfârșitul primei decade, pentru majoritatea zilelor celei de-a doua, sunt prognozate temperaturi medii zilnice peste minimul biologic necesar vegetației culturilor de cereale de toamnă.



În a treia decadă a lunii martie, dezvoltarea culturilor agricole va decurge sub temperaturi apropiate de normele climatice. Până la sfârșitul lunii, în grâu va predomina faza de încălțare. La culturile de cereale de toamnă semănate în termenul agrotehnic, se va observa o creștere a coeficientului de încălțare.

În cursul lunii martie, la culturile pomicole vor avea loc următoarele faze: umflarea, deschiderea mugurilor fructiferi, formarea bobocilor și înflorirea la speciile cu floare timpurie de sămbure (migdal, cais, piersic, cireș). Temperaturile minime prognozate în cursul lunii, până la minus 7°C, vor fi critice pentru pomii fructiferi care au intrat în fazele de formare a bobocilor și de înflorire.

Precipitațiile așteptate în martie, apropiate de normele lunare, vor menține rezerve bune de umiditate a solului pentru culturile de cereale de toamnă. Datorită precipitațiilor peste medie din februarie (Șumen -103 l/m², Razgrad -104 l/m², Ruse - 103 l/m², Silistra - 100 l/m², Dobrici - 98 l/m², Haskovo - 155 l/m², Kardjali - 151 l/m², Sliven -111 l/m², St. Zagora - 130 l/m², Elhovo - 123 l/m², Șirpan - 119 l/m²), rezervele de umiditate din stratul de sol de 100cm pentru culturile semănate toamna au atins niveluri apropiate de Capacitatea de Câmp.

La mijlocul lunii martie începe perioada agrotehnică (15-20.03) pentru semănatul floarea-soarelui în sudul Bulgariei, iar la mijlocul celei de-a treia decade (25.03-5.04) – în Câmpia Dunării.