

Boală periculoasă a viței de vie: BABH introduce măsuri de carantină

Автор(и): Растителна защита
Дата: 16.03.2026 Брой: 3/2026



Agenția Bulgară pentru Siguranța Alimentelor (BFSA) a plasat 20,66 de hectare dintr-o zonă viticolă din regiunea Veliko Tărnovo sub carantină. În jurul acestora a fost stabilită o zonă tampon de aproximativ 140 de hectare, pentru o perioadă de un an. Măsura a fost luată din cauza pericolului fitoplasmatoz (*Grapevine flavescence dorée*) - agentul cauzator al flavescenței aurii a viței de vie. Prezența patogenului a fost confirmată prin teste moleculare la Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară al BFSA, în urma unui raport de la un institut de cercetare și proprietarul plantației.

Boala se răspândește prin material de înmulțire infectat și printr-un vector (purtător) – cicada americană a viței de vie (*Scaphoideus titanus*), care se hrănește cu seva viței de vie și poate transmite patogenul de la plante infectate la cele sănătoase.

A fost înființată o organizare pentru eradicarea focarului identificat.

Pe parcursul anului următor vor fi efectuate anchete complete ale plantațiilor viticole din zonă, vor fi prelevate probe, vor fi efectuate analize de laborator și va fi realizat monitorizarea prezenței vectorului bolii. Scopul măsurilor este limitarea la timp a bolii și protejarea sectorului viticol din țară.

Boala este considerată una dintre cele mai periculoase pentru vița de vie din Europa. Poate duce la reducerea recoltelor cu până la 50 la sută și la uscarea treptată a plantelor de viță de vie. Datorită riscului ridicat de infecție, fitoplasma este clasificată ca dăunător de carantină în Uniunea Europeană și este supusă unui control fitosanitar strict.

Programul Național de Măsuri pentru Prevenirea Răspândirii și Combaterea Dăunătorilor la Vița de Vie (genul *Vitis*) acordă o atenție deosebită „vectorilor” – organismelor care transmit și răspândesc agenții patogeni ai plantelor (virali, fitoplasmici), cum ar fi cicada americană a viței de vie (*Scaphoideus titanus*), vector al fitoplasmei *Flavescence dorée*-PHYP64, agentul cauzator al *flavescenței aurii* a viței de vie. Fitoplasma este inclusă în Anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072, în „Lista dăunătorilor de carantină ai Uniunii și codurile lor respective”; Partea B – „Dăunători cunoscuți a fi prezenți pe teritoriul Uniunii”. Cicada americană a viței de vie, vectorul fitoplasmei, este stabilită pe teritoriul Bulgariei. Unele țări europene (Franța) implementează deja programe de tratament insecticid obligatoriu sau de smulgere sanitară a viței de vie, având ca scop limitarea răspândirii *flavescenței aurii* a viței de vie (fitoplasma *Flavescence dorée*).



Cicada americană a viței de vie (Scaphoideus titanus) – adult

Nimfele și adulții cicadei americane a viței de vie (*Scaphoideus titanus*) achiziționează fitoplasma *Flavescence dorée* în timpul hrănirii pe frunzele plantelor infectate. Perioada latentă după achiziție este de 4-5 săptămâni, după care cicada transmite *Flavescence dorée* pentru tot restul vieții sale. Specia dezvoltă o generație pe an și iernează sub formă de ou în viță. Nimfele eclozează în aprilie. Ele se hrănesc (sug seva) din frunze și din vârfurile verzi tinere ale lăstarilor de pe viță.

Adulții apar în iulie. Copulația are loc în august, iar depunerea ouălor în viță are loc în septembrie.

De la începutul lunii mai până la sfârșitul lunii iunie (în funcție de condițiile meteorologice), se efectuează inspecții ale plantațiilor viticole pentru căutarea larvelor de *Scaphoideus titanus*. Acestea sunt fără aripi și saratoare. Pielile larvare aruncate pot fi găsite pe partea inferioară a frunzelor. În timpul inspecției se folosește o lupă.

Perioada pentru plasarea capcanelor adezive galbene – de la începutul lunii iulie până la sfârșitul lunii septembrie. Capcanele sunt instalate și verificate la fiecare două săptămâni, adică în trei luni există șase runde de instalare și verificare.

Mai multe pe această temă:

**Programul Național de Măsuri pentru Prevenirea Răspândirii și Combaterea
Dăunătorilor la Vița de Vie (genul Vitis) - un ghid important pentru toți viticultorii și
agronomii specialiști**