

În octombrie: Care vor fi condițiile agrometeorologice și când sunt datele optime de semănat

Растителна Защита

Data 09.10.2026 | Număr 10/2026 | ISSN 2815-522X | Limba RO

www.plant-protection.com/article/2478?lang=ro



În primele zece zile ale lunii octombrie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de vreme instabilă și temperaturi medii zilnice în jurul și sub normele climatice. Vremea răcoroasă și umedă prognozată în majoritatea zilelor acestei perioade va fi o premisă pentru dezvoltarea agenților patogeni - putregaiul brun târziu al fructelor la soiurile de toamnă ale pomilor fructiferi (*Monilia fructigena*), mucegaiul cenușiu (*Botrytis cinerea*) pe recolta de struguri nerecoltată. La sfârșitul perioadei de zece zile sunt așteptate înghețuri masive, ceea ce impune recoltarea la timp a culturilor de legume supuse înghețului.



*Putregaiul brun târziu al fructelor la soiurile de toamnă ale pomilor fructiferi (*Monilia fructigena*)*

În primele zece zile ale lunii octombrie, sunt prognozate precipitații, îmbunătățirea stării straturilor superioare ale solului și a condițiilor pentru efectuarea lucrărilor sezoniere ale solului. Seceta de la sfârșitul verii a împiedicat efectuarea lucrărilor de pregătire a solului înainte de semănat pe suprafețele

destinate însămânțării cu culturi de toamnă. Din acest motiv, termenele agrotehnice din septembrie pentru însămânțarea rapiței de toamnă au fost ratate.



Octombrie este perioada optimă pentru însămânțarea cerealelor de toamnă. În primele zece zile este termenul agrotehnic pentru însămânțarea grâului în nordul Bulgariei, de la 15 până la 25 octombrie - în sudul Bulgariei, iar la sfârșitul lunii – în zonele de-a lungul coastei Mării Negre.

Condițiile agrometeorologice în perioada 9-16 octombrie vor fi dinamice. La începutul acestei perioade de șapte zile, temperaturile medii zilnice prognozate vor fi peste normal, iar în restul perioadei acestea se vor situa în limitele normelor climatice. La începutul perioadei, sunt prognozate precipitații locale și slabe în vestul Bulgariei, iar spre mijlocul perioadei și în zonele de câmpie din centrul și estul Bulgariei. Pe alocuri cantitățile vor fi semnificative, ceea ce va îmbunătăți umezirea straturilor superioare ale solului. Nu sunt așteptate condiții pentru formarea înghețurilor.

Cu excepția unor zone din vestul Bulgariei, în prima jumătate a perioadei de prognoză, condițiile agrometeorologice vor fi favorabile pentru recoltarea finală a plantațiilor de struguri și pomi fructiferi, curățarea suprafețelor de culturi prășitoare și legume târzii, precum și pentru ridicarea furajelor și sfeclei de zahăr, care se află în faza de maturitate tehnologică. Condițiile vor fi favorabile pentru efectuarea activităților agrotehnice legate de însămânțarea cerealelor de toamnă. În caz de infestare puternică cu buruieni a suprafețelor, este recomandabil să se efectueze aplicarea de toamnă a erbicidelor.



Până la mijlocul perioadei, condițiile agrometeorologice vor permite aplicarea îngrășămintelor minerale și organice, precum și plantarea de toamnă a cepei pentru verdețuri, a usturoiului de toamnă, a salatei și a spanacului.

Ploile așteptate în a doua jumătate a perioadei de prognoză vor limita considerabil posibilitățile de efectuare a activităților agricole.

În timpul celei de-a doua și celei de-a treia perioade de zece zile, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi apropiate de cele obișnuite. Precipitațiile așteptate în prima jumătate a celei de-a doua perioade de zece zile, la începutul celei de-a treia și la sfârșitul lunii, vor îmbunătăți rezervele de umiditate ale solului în stratul de 50 cm și condițiile pentru desfășurarea fazelor inițiale ale vegetației culturilor de toamnă însămânțate. La sfârșitul lunii octombrie, la grâu și orz, în funcție de datele de însămânțare, se vor observa fazele de răsărire și formare a 1-2-3 frunze.



În octombrie, culturile de toamnă sunt atacate de dăunători. La cerealele de toamnă, trebuie monitorizată prezența șoarecelui de câmp comun, a gândacului grâului și a muștelor grâului. Când

numărul dăunătorilor depășește pragul economic de dăunare (PED), este necesar un tratament la timp. Pentru șoarecele de câmp comun, PED este de 2

colonii active pe decar, pentru gândacul grâului - 3 larve/m².