


Pulverizarea de iarnă a pomilor fructiferi

Автор(и): Растителна защита
Дата: 28.02.2016 Брой: 2/2016



Efectuați această operațiune în timp uscat, în luna februarie. Stropitul de iarnă nu trebuie să coincidă cu tăierile de iarnă, deoarece pentru stropit se folosesc produse de protecție a plantelor care provoacă daune dacă intră în contact cu rănille de la tăiere. Pentru stropit sunt potrivite zilele liniștite, fără vânt, deoarece astfel nu există riscul ca soluția să fie dusă de vânt.

Când: În perioada de repaus a pomilor.

Scop: Distrugerea stadiilor de dăunători și agenți patogeni care iernează pe trunchiurile și ramurile acestora:

- gălbinarea frunzelor de piersic, gaura de ploaie, mănuchiul brun timpuriu, puna prunului, arsura bacteriană;

- ouăle de iarnă ale acarienului roșu al fructelor, afidelor, psilidelor mărului și părului, moliilor de iarnă, păduchelui San José și altor păduchi plani, păduchelui prunului, viermelui mărului, acarienului păducelului, păianjenului roșu comun și acarienului galben al mărului;

Puncte importante:

- Stropitul de iarnă împotriva dăunătorilor este necesar doar dacă există o densitate dovedită a populației peste pragul economic de daună. Pentru boli, însă, este obligatoriu.
- Cel mai bun efect al stropirii de iarnă se obține atunci când aceasta este efectuată imediat înainte de umflarea mugurilor. În acel moment, începe dezvoltarea stadiilor de iernare ale insectelor și acarienilor. Embrionul din ou este într-un stadiu avansat de dezvoltare, iar omizile și insectele adulte care iernează părăsesc adăposturile de iarnă și se deplasează de-a lungul ramurilor pomilor.
- Produsele și munca dumneavoastră vor fi irosite dacă nu stropiți corespunzător. Udați temeinic cu soluție toate părțile ramurilor, lăstarilor și punctelor de ramificare, unde dăunătorii se acumulează cel mai des, precum și trunchiul. Cu alte cuvinte, „îmbăiați” întregul pom.

Produse:

- Împotriva bolilor – amestecul Bordeaux 1 %, iar împotriva gălbănirii frunzelor de piersic doar – în plus față de acesta, pot fi utilizate fungicidele Funguran OH 50 WP – 0,15 %, Champion – 0,3 %, Dithane DG – 0,3 %, Dithane M-45 – 0,3 % sau Thiram 80 WG – 0,3 %.
- Împotriva dăunătorilor – Parazomer 0,3 %.

Dacă aveți peri

La o temperatură de 3–5 °C și vreme însorită, psila părului migrează în interiorul coronamentului și începe să se hrănească, iar la o temperatură de 8 °C începe să depună ouă. Acesta este momentul pentru stropit. O eficacitate bună se va obține de la Alfamec 100 EC – 0,0125 % sau Sumi Alpha 5 EC – 0,03 %. După începerea depunerii ouălor, se recomandă Deltamec 2.5 EC – 0,03 %.