

Șoarecii de câmp caută hrană în livezi.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 28.02.2016 Брой: 2/2016



Dacă observați că scoarta din jurul gâtului rădăcinii la pomii fructiferi a fost roșă, iar la unii a fost ros și cambiumul, acestea sunt daune provocate de șoareci. Invazia lor anul trecut a fost masivă în livezile fructifere care erau puternic infestate cu buruieni (acoperite cu buruieni).

În livezi, șoarecii se hrănesc cu vegetația ierboasă abundentă sau cu numeroasele fructe căzute, infestate cu viermi, până la începutul înghețurilor de iarnă, chiar și după ce a căzut zăpada. Ei încep să se hrănească cu scoarta gâtului rădăcinii și a rădăcinilor după ce înghețurile de iarnă au trecut, când vegetația ierboasă este uscată și fructele căzute s-au putrezit deja. Ei provoacă cele mai mari daune plantelor fructifere în perioada din ianuarie până la sfârșitul lunii martie.

Trebuie să vă inspectați cu atenție livezile. Dacă descoperiți colonii de șoareci, îndepărtați imediat mulciul – frunzele uscate și ierburile din rând, prin săpare sau arat. Plasați momele otrăvite în găuri. Pregătiți-le cu boabe de porumb sau grâu fierte până devin moi și amestecați-le cu fosfură

de zinc (30 g fosfură de zinc la 1 kg porumb sau grâu). Plasați momelele în jurul tulpinilor și la intrările găurilor. Este obligatoriu să le acoperiți pentru a nu se otrăvi păsările.