

Noi dăunători la tomate - *C. includens*

Автор(и):

Дата: 13.03.2016 Брой: 3/2016



Printre dăunătorii cu un risc ridicat pentru țările din regiunea OEPP se numără următoarele specii din familia Noctuidae:

***Chrysodeixis (Pseudoplusia) includens* (Lepidoptera: Noctuidae)**

Plante gazdă: *C. includens* este polifag, atacând plante din 28 de familii, dar este considerat în principal un dăunător pentru soia și tomate. Printre celelalte plante, trebuie menționate lucerna, tutunul, fasolea, soia, porumbul, bumbacul, varza, salata, precum și specii ornamentale precum geraniumul, hibiscusul, pelargonia, crizantema și altele.

Daune: Fluturii își depun ouăle pe frunze, larvele se hrănesc cu acestea sau cu fructele (la tomate larva se hrănește în interiorul fructului) și se transformă în pupă pe frunze. Deși atacă multe plante, următoarele daune sunt observate la gazdele principale – soia și tomate:

- La tomate, larvele se hrănesc în principal cu fructele, chiar și atunci când există frunziș disponibil.
- La soia, după ce distrug complet frunzișul, larvele se mută pe păstăi și se hrănesc cu acestea.

Răspândire: În SUA, adulții (fluturii) supraviețuiesc iarna în statele sudice, unde este mai cald (Florida și Texasul de Sud). După încălzirea primăverii, aceștia migrează spre nord către celelalte state. Clima din statele sudice este similară cu cea din Mediterana. La introducerea în Europa, fluturii ar putea supraviețui cu succes iarna și, primăvara, să migreze în alte țări mai nordice, precum Bulgaria.

Căi de introducere: Fructe și legume, plante pentru plantare, flori tăiate, păstăi de plante gazdă, din țările în care sunt prezente.

Risc potențial: Analiza Riscului de Dăunător evaluează riscul ca fiind ridicat, datorită faptului că *C. includens* atacă o gamă largă de gazde care sunt cultivate în țările regiunii. Dacă dăunătorul este introdus, acesta va putea supraviețui iarna în țările mediteraneene și să migreze spre nord.