

Dăunători noi la roșii - noctuida cu dungi galbene

Автор(и):

Дата: 13.03.2016 Брой: 3/2016



Printre dăunătorii cu risc ridicat pentru țările din regiunea OEPP se numără următoarele specii din familia Noctuidae:

***Spodoptera ornithogalli* (Lepidoptera: Noctuidae) (“viermele-de-armată cu dungi galbene”)**

Plante gazdă: Polifag, atacă o gamă largă de plante, cum ar fi: roșii, ardei, vinete, cartofi, tutun, ceapă, arahide, plante din familia Brassicaceae, Cucurbitaceae, bumbac, in, orez, porumb, fasole, mazăre, soia, floarea-soarelui, lucernă, morcov, castravete, sfeclă de zahăr, sparanghel.

Daune: Fluturul depune ouăle pe frunze. După eclozare, larvele se hrănesc cu acestea, dar și cu fructele de roșie, ardei și bumbac. Dăunătorul se intenționează în sol. *S. ornithogalli* este menționat

ca un dăunător major în sudul Statelor Unite la culturile legumicole precum roșii, ardei, leguminoase, cucurbitacee, precum și tutun, soia, porumb și lucernă.

Diseminare: Pe distanțe scurte se răspândește prin zborul adulților.

Căi de pătrundere: În zone noi, dăunătorul este introdus cu fructe legumicole, plante pentru plantare și flori tăiate de la plante gazdă, provenind din țări în care *S. ornithogalli* este prezent.

Risc potențial: *S. ornithogalli* atacă numeroase culturi care sunt de importanță primordială pentru Europa. Conform studiilor Organizației Europene și Mediteraneene pentru Protecția Plantelor (OEPP), există un risc ridicat de introducere a dăunătorului în regiune. Acesta nu poate supraviețui iernii în nord, dar în timpul sezonului de vegetație este probabil să se răspândească și să se stabilească în sere.