

În vie și livadă în aprilie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 18.04.2016 Брой: 4/2016



Vii

Condițiile meteorologice din a doua jumătate a lunii aprilie sunt de obicei foarte favorabile pentru apariția bolilor vitei de vie. Perioadele dinaintea și în timpul înfloririi sunt cele mai critice pentru infecția cu mană și făinare și pentru infestarea cu acarieni și molii.

Principalii dăunători pentru perioadă

Făinarea (oidium)

Mana viței de vie

Acarianul galben al viței de vie

Acarieni eriofizi

Molia europeană a viței de vie

Păduchele de scut al viței de vie

Plante pomicole

Pe parcursul lunii, fructele speciilor pomicole se formează activ și își măresc dimensiunea. Temperaturile ridicate și ploile frecvente necesită o protecție intensivă a plantelor pentru a le apăra împotriva bolilor. Sunt necesare inspecții și anchete regulate pentru a monitoriza apariția și dezvoltarea bolilor și dăunătorilor. La speciile pomicole cu fructe pepene, combaterea este îndreptată împotriva principalelor boli și dăunători – pojar, făinare, arsura bacteriană, afide, omizi defoliatoare, molii fructelor etc. La speciile pomicole cu sâmbure, atenția se acordă atacurilor de putregai brun timpuriu (arsura florilor), găurirea frunzelor, făinare, rugină albă, Gnomonia, molii fructelor, afide etc. Dinamica și densitatea populației moliilor fructelor se determină prin plasarea de capcane cu feromoni în livezi, precum și a plăcuțelor galbene lipicioase de tip "Rebell" pentru a stabili începutul zborului muștei fructelor de cireș.

Principalii dăunători pentru perioadă

Pojarul mărului

Făinarea mărului

Păduchele de scut San José

Omida țesătoare de toamnă

La măr, tratamentele împotriva celor mai importante boli din punct de vedere economic – pojar și făinare – pot fi efectuate în combinație.

Fungicidele înregistrate pentru combatere sunt enumerate în Registrul produselor pentru protecția plantelor autorizate pentru utilizare /2016, publicat de revista "Protecția plantelor".