

În grădina de legume în aprilie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 18.04.2016 Брой: 4/2016



Practici în perioada respectivă: Îngrijirea răsadurilor pentru producția timpurie și semi-timpurie în câmp deschis continuă. Parcelele sunt pregătite pentru transplantarea roșiilor, ardeilor și vânățătorilor timpurii la sfârșitul lunii aprilie, iar a celor semi-timpurii în primele zece zile ale lunii mai. Sunt semănate semințe de roșii târzii și varză căpățână semi-timpurie. Se aplică practicile agrotehnice necesare pentru a asigura condiții optime pentru dezvoltarea culturilor în incintele de cultură protejată. La temperaturi mai ridicate, pentru a îmbunătăți umiditatea relativă a aerului, cărările sunt umezite frecvent, iar în serele din sticlă se efectuează și pulverizări scurte de ceață. Dacă radiația solară este mai intensă, sticla este umbrită (albărită) cu amestecuri adecvate.

Protecția plantelor:

1. Tratamentul pre-semănat al semințelor de roșii și varză, dacă acestea nu au fost dezinfectate. Cerințele tehnologice trebuie respectate pentru a nu distruge germinarea semințelor.

2. Amestecurile de sol din răsadnițe trebuie obligatoriu dezinfectate. Momele împotriva coropișnițelor sunt împrăștiate.
3. Pentru combaterea tăierii răsadurilor, plantele bolnave și plantele sănătoase adiacente acestora sunt îndepărtate și distruse în afara serei, iar solul de sub ele este udat cu o soluție fungică.
4. Cu ultima lucrare a solului, se aplică insecticide granulare împotriva viermilor sârmă atunci când în ancheta preliminară s-au stabilit mai mult de 5 buc/m². Tratamentul este eficient și împotriva omizilor păroase, coropișnițelor, lăcustelor de pământ, gândacului colorado, nematodelor și are efect rezidual împotriva dăunătorilor suctori – afidelor, cicadelor, tripsilor.
5. Cu o săptămână înainte de transplantare, răsadurile sunt stropite cu fungicide. La **roșii** se observă **mancha alternaria (Alternaria)**, **putregaiul cenușiu (Botrytis)**, **făinarea**, **mușegaiul frunzelor**, iar la **castraveți – făinarea, mancha, patarea unghiulară (bacterioza)**.
6. Deși complexul de dăunători din incintele de cultură protejată este același, datorită temperaturii mai ridicate și umidității relative scăzute a aerului, activitatea dăunătoare a **tripsilor** și a **păienjenișului** crește.
7. La culturile timpurii în câmp deschis există riscul apariției **manchei** – la crucifere, ceapă și cartofi timpurii. Trebuie monitorizate semnalele de la serviciile regionale și implementate măsuri de combatere la timp.
8. Există risc pentru culturile de ceapă de la **musca cepei și musca minerului frunzelor**, iar pentru varză și ridiche – de la **musca varzei**.

Atenție: La stropirea culturilor de crucifere și ceapă, trebuie adăugat obligatoriu un adjuvant în soluția de pesticide. Este necesară prudență la tratarea cepei verzi și usturoiului, ridichii etc., care sunt oferite pentru consum proaspăt la începutul primăverii, pentru a evita otrăvirile nedorite și periculoase cu reziduuri de pesticide.