

În grădina de legume în mai și iunie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 22.05.2016 Брой: 5/2016



Practici în perioada respectivă: Se îngrijesc răsadurile pentru roșiile târzii, varza și conopida mijlociu-timpurii, prazul – irigare, fertilizare, prășire. Se aplică practicile agrotehnice necesare pentru legumele de câmp timpurii deja transplantate și pentru culturile legumicole răsărite direct. Perioada se caracterizează prin ploi frecvente și, în consecință, umiditate mai mare a aerului și solului. Se formează așa-numitele perioade critice pentru apariția și dezvoltarea **manei la cartof** și a speciilor de **mucegai păros** la varză și ceapă, determinate de un complex de condiții agrometeorologice: înnorare completă, 2–3 zile de calm și precipitații îndelungate, temperatură mai scăzută, umiditate relativă a aerului peste 80%. Dacă precipitațiile sunt de scurtă durată, favorizează dezvoltarea **manei timpurii (pete negre pe frunze)**, iar dacă sunt însoțite de vânt puternic – a **bolilor bacteriene (pete și arsuri pe frunze)**.

Protecția plantelor:

Boli la roșii și castraveți

Roșii: la răsaduri se observă **mana timpurie (pete negre pe frunze)** (*Alternaria*) și **mana târzie**. În culturile protejate, pe lângă acestea, apar **mana făinoasă, putregaiul cenușiu** (*Botrytis*), iar la roșiile cultivate în câmp – și **petele și arsurile bacteriene pe frunze**, dar fără **mana făinoasă**. Combaterea în producția de câmp trebuie efectuată la notificarea serviciilor regionale.

Castraveți: în culturile protejate se întâlnesc **mana făinoasă și cea păroasă, patarea unghiulară a frunzelor** (boală bacteriană).

Dăunători la roșii și castraveți în culturile protejate au o compoziție constantă, dar pentru păianjenii roșii și trips condițiile sunt mai favorabile pentru o activitate dăunătoare severă – temperaturi ridicate și umiditate relativă scăzută. Prin urmare, este necesară stropirea frecventă și cărările trebuie menținute umede. Sticla trebuie umbrită cu amestecuri adecvate. Având în vedere că culturile sunt în rodire intensă, trebuie utilizate pesticide cu un interval scurt între tratament și recoltare.

În câmp la roșii, ardei, vinete în această perioadă sunt dăunători: **afidele, tripsurile** (vectori ai virusului patării bronzate a roșiei), **viermii tăietori, gândacul colorado**, iar de obicei de la începutul lunii iunie începe zborul **fulgoridei** *Hyalesthes obsoletus*, care transmite fitoplasma **stolburului**. Combaterea are succes atunci când tratamentele sunt efectuate în momentul cel mai potrivit, așa cum indică serviciile regionale de protecție a plantelor.

Varza este atacată de **mucegaiul păros**, împotriva căruia se aplică produsele recomandate pentru mana de la cartof. Printre dăunători, sunt nocivi: **afidele, puricele de varză, ploșnițele, tripsul tutunului, mușca cepei, omizile moliei varzei, moliei diamantate, sfredelitoarea varzei**.

Ceapa – atenția trebuie concentrată asupra **mucegaiului păros, tripsului tutunului, muștei miner a prazului**. Împotriva acestora se aplică produsele indicate mai sus pentru celelalte culturi.

Nu uitați să adăugați un agent de udare și adeziune în soluțiile de pesticide aplicate culturilor de varză și ceapă.