

Proгноză agrometeorologică pentru luna iunie 2016

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.06.2016 Брой: 6/2016



În prima jumătate a lunii iunie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de vreme instabilă și rece pentru sezon. Precipitațiile frecvente prevăzute și temperaturile sub normale vor crea condiții optime pentru dezvoltarea bolilor fungice. La începutul lunii iunie, dezvoltarea culturilor agricole va decurge într-un ritm mai lent, dar în a treia decadă, o mare parte a culturilor de primăvară va intra într-o etapă reproductivă a dezvoltării - la porumbul hibrid timpuriu se va observa faza de înflorire, iar la floarea-soarelui, începutul fazei de înflorire.

În prima jumătate a lunii iunie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de vreme instabilă și rece pentru sezon. **Precipitațiile frecvente prevăzute și temperaturile sub normale vor crea condiții optime pentru dezvoltarea bolilor fungice - mană la viță de vie și culturi legumicole, putregaiul brun la fructele de cireș, mucegaiul cenușiu la fructele de căpșun, tăciunele la măr și păr, gaura de glonț la speciile sâmburoase, etc.**

La începutul lunii iunie, dezvoltarea culturilor agricole va decurge într-un ritm mai lent. În prima decadă, faza de coacere lăptoasă va predomina la culturile de cereale de toamnă din regiunile de câmp. În unele părți ale Câmpiei Dunării și în sudul Bulgariei, se va observa și începutul fazei de coacere cerată la orz și grâu. Până la mijlocul lunii iunie, orzul își va finaliza dezvoltarea. În această perioadă, rapița de toamnă va fi în faza de coacere.

În a doua jumătate a lunii iunie, se prevăd o îmbunătățire treptată a condițiilor termice. Vegetația culturilor de primăvară și fazele finale de dezvoltare a semănăturilor de toamnă vor decurge în ritmuri moderate, cu temperaturi apropiate de normele climatice. **La sfârșitul celei de-a doua și începutul celei de-a treia decade, coacerea cerată va predomina la grâu. Se așteaptă o recoltă bună și foarte bună de grâu. Randamentele medii prevăzute pentru grâu în unele regiuni ale Dobrogei se estimează a depăși 550 kg/decariu.**

În a treia decadă, o mare parte a culturilor de primăvară va intra într-o etapă reproductivă a dezvoltării - la porumbul hibrid timpuriu se va observa faza de înflorire, iar la floarea-soarelui, începutul fazei de înflorire.

Condiții mai potrivite pentru desfășurarea activităților agrotehnice sezoniere vor apărea în a doua jumătate a lunii. În iunie, se prevăd și șanse crescute de furtuni cu grindină. În cazul unor avarii provocate de grindină, se recomandă tratarea culturilor pomicole și legumicole afectate cu fungicide care conțin cupru la prima oportunitate.

Sursa: NIMH-BAS