

Fungul putregaiului rădăcinilor (Heterobasidium annosum)

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.06.2016 Брой: 6/2016



Cercetările patologice forestiere efectuate de Stațiile de Protecție a Pădurilor – Sofia, Plovdiv, Varna indică faptul că în arboretele afectate de vânt în regiunile specificate, precum și în majoritatea arboretelor și plantațiilor de molid de pe Vitoșa, se observă și infestări cu ciuperca putregaiului de rădăcină (*Heterobasidium annosum*). Această ciupercă se dezvoltă în lemnul de bătrânețe al molidului, bradului și pinului macedonean pe parcursul a câtorva decenii, atingând o înălțime de 7–8 m, în unele cazuri chiar mai mare, fără niciun simptom extern vizibil. În timpul vânturilor puternice, extreme sau al ninsorilor umede abundente, tulpinile se rup la înălțimea corespunzătoare dezvoltării putregaiului lemnos cauzat de ciupercă.

În ultimii ani, suprafața totală infestată a crescut cel mai rapid în regiunile Direcțiilor Regionale Silvice Kyustendil, Blagoevgrad și Sofia. În aceste arborete și plantații este planificată tăierea

sanitară. Se poate anticipa o creștere a suprafeței și intensității infestărilor cu această ciupercă în arboretele de conifere în vârstă de 30–40 de ani din Rodopii de Vest, înființate pe foste terenuri agricole, precum și în pădurile mature de molid de pe Vitoșa, Pirin și Rila.