

Proгноza agrometeorologică pentru iulie 2016

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.07.2016 Брой: 7/2016



În primele zece zile ale lunii iulie se prognozează precipitații peste normal, precum și o îmbunătățire a rezervelor de umiditate a solului și a condițiilor pentru vegetația culturilor de primăvară. Cu toate acestea, temperaturile maxime ridicate prognozate în ultima decadă a lunii vor avea un efect advers asupra înfloririi și fertilizării la culturile legumicole și la hibrizii mai târzii de porumb.

În luna iulie, dezvoltarea culturilor agricole se va desfășura la temperaturi apropiate de normele climatice. Factorul determinant pentru vegetația culturilor de primăvară vor fi rezervele de umiditate a solului. La începutul verii, ca urmare a vremii uscate și calde, rezervele de umiditate din straturile de sol de 50 și 100 cm au scăzut semnificativ. În unele zone de câmp, la porumb și floarea-soarelui, acestea erau la niveluri sub 65% din CCI (capacitatea de câmp pentru apă).

În primele zece zile ale lunii iulie se prognozează precipitații peste normal, precum și o îmbunătățire a rezervelor de umiditate a solului și a condițiilor pentru vegetația culturilor de

primăvară, dintre care unele se află în stadiul reproductiv al dezvoltării și au cerințe crescute de umiditate în sol. În această decadă, la hibrizii mai timpurii de porumb se vor observa următoarele stadii – înmugurirea panicului, înflorirea panicului și apariția firelor de mătase, în timp ce la hibrizii mai târzii – formarea frunzelor. La floarea-soarelui va avea loc stadiul de înflorire; la bumbac – predominant stadiul de înmugurire; iar la fasole și soia – formarea păstăilor.

Vremea instabilă așteptată cu precipitații frecvente până la mijlocul lunii va îngreuna recoltarea grâului în multe părți ale țării. Se prognozează o probabilitate crescută de grindină și un risc de pierderi ale culturilor de cereale nerecoltate. În a doua decadă, dezvoltarea culturilor agricole va progresa într-un ritm moderat.

În ultima decadă, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de vreme caldă și relativ uscată. Condițiile termice peste normal prognozate vor accelera vegetația culturilor de primăvară. În această decadă, hibrizii timpurii de porumb vor intra în stadiul de coacere lăptoasă; la floarea-soarelui va avea loc umplerea semințelor; la bumbac – stadiul de înflorire. La sfârșitul lunii, în zonele de câmp, se va observa stadiul de coacere la fasole. Temperaturile maxime extrem de ridicate prognozate, local până la 38–39°C, vor avea un efect advers asupra înfloririi și fertilizării la culturile legumicole și la hibrizii mai târzii de porumb.

În ultima decadă, vremea uscată și caldă va limita dezvoltarea unei serii de boli fungice, cu excepția făinării la pomii fructiferi, culturile legumicole și vița de vie. La culturile pomicole, combaterea celei de-a doua generații de molii ale fructelor nu trebuie subestimată. Tratamentele de protecție a plantelor sunt recomandate a fi efectuate în orele mai răcoroase ale zilei.

Sursa: INMH - BSA