

Sera pentru fluturi

Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.07.2016 Брой: 7/2016



Battus philenor este un fluture din familia *Papilionidae*, care este distribuit în principal în statele sudice ale Americii de Nord. Guatemala este cea mai sudică graniță unde condițiile pentru dezvoltarea speciei sunt favorabile. Cu cât climatul este mai blând și mai cald, cu atât este mai mare probabilitatea de a întâlni fluturile *Battus philenor*.

În ultimii ani, specia a fost amenințată cu dispariția din teritoriul Americii de Nord. Datorită biologului acvatic Tim Wong de la Academia de Științe din California, fluturii frumoși și-au mărit populația în ultimii 3 ani, nu în condiții de laborator, ci în curtea din spatele casei omului de știință. Biologul creează condițiile perfecte pentru dezvoltarea *Battus philenor* - lumină solară suficientă, temperatură ridicată a aerului și hrană potrivită. Wong a descoperit că fluturii se hrănesc doar cu *Aristolochia californiană*, care este o plantă tipică pentru zonă. Prin urmare, el a plantat mai întâi planta agățătoare în curtea din spate a casei sale și apoi a adus 20 de omizi. Fluturii se simt ca acasă la biologul Tim Wong.

În Bulgaria, planta *Aristolochia*, *Luleaua Olandezului* (*Aristolochia macrophylla*), care aparține aceleiași familii ca și *Aristolochia californiană*, poate înflori.

Planta agățătoare atinge o înălțime de 10 m, crescând 1-2 m pe an. Are frunze mari impresionante, atingând 30 cm lungime în formă de inimă, motiv pentru care este adesea folosită ca plantă ornamentală în grădini. Acestea stau pe pețiole lungi de 5-10 cm, sunt de un verde închis și moi la atingere. Posedă flori neobișnuit de mici în formă de tub, care înfloresc primăvara (mai-iunie). Se dezvoltă cel mai bine în umbră parțială și sol bogat, umed.

Origine: America de Nord.

Locație: De la umbros la semi-umbros și ferit de vânt.

Udare, Fertilizare: Udați abundent în perioada de creștere. Plantele tinere sunt fertilizate de 2-3 ori, iar cele mature de 2 ori.

Îngrijire Alte: Asigurați o structură de cățărare.

Iernare: În exterior fără protecție de iarnă. Își pierde frunzele. Udați moderat în zilele mai calde dacă se usucă.

Dăunători, Boli: Rareori.

Bazat pe materiale de la boredpanda.

[Vizualizați galeria de mai jos.](#)