

Prognoză agrometeorologică pentru august 2016

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.08.2016 Брой: 8/2016



Se așteaptă o scădere a temperaturilor și o normalizare a condițiilor termice la mijlocul primei decade. În decada din vestul Bulgariei se prognozează precipitații și o îmbunătățire a condițiilor pentru dezvoltarea culturilor agricole.

În august, dezvoltarea culturilor agricole va decurge la temperaturi în jurul și peste normele climatice, iar în cea mai mare parte a țării – în condiții de deficit de umiditate a solului. La sfârșitul lunii iulie, rezervele de umiditate a solului din stratul de 50 și 100 cm la culturile de primăvară, cu excepția unor locuri din regiunile vestice, erau reduse – sub 50–60% din capacitatea de câmp.

La începutul lunii august, vremea uscată și caldă prognozată, în locuri cu temperaturi maxime extrem de ridicate până la 38–39°C, va perturba cursul normal al proceselor fiziologice la culturile de primăvară și va avea un impact negativ asupra înfloririi și fertilizării la hibridii de porumb târziu și la culturile legumicole.

Se așteaptă o scădere a temperaturilor și o normalizare a condițiilor termice la mijlocul primei decade. În decada din vestul Bulgariei se prognozează precipitații și o îmbunătățire a condițiilor pentru dezvoltarea culturilor agricole. În regiunile estice și sudice deficitul de umiditate a solului se va adânci, ceea ce va impune aplicarea unor norme sporite de irigare la culturile de primăvară târzii.

În prima decadă a lunii august, la hibrizii timpurii de porumb va avea loc stadiul de maturitate lăptoasă și trecerea de la maturitatea lăptoasă la cea cearoasă. La floarea-soarelui, în unele locuri din Câmpia Dunării și în regiunile sudice ale țării, se va observa începutul stadiului de coacere.

În a doua jumătate a lunii august, o parte din culturile de câmp târzii își vor finaliza dezvoltarea. La floarea-soarelui se va observa maturitatea tehnică de masă, iar la soia – stadiul de coacere. La sfârșitul lunii, la hibrizii de porumb mijlociu-târzii va predomina maturitatea cearoasă. La bumbac se va observa începutul deschiderii capsulelor.

În a treia decadă a lunii august, se așteaptă o schimbare a condițiilor agrometeorologice. Se prognozează o probabilitate crescută de precipitații, precum și o îmbunătățire a stării apei din straturile superioare ale solului, ceea ce este de o importanță deosebită pentru aratul profund de calitate superioară și pentru pregătirea pre-semănată a suprafețelor destinate semănatului cu rapiță de toamnă. La sfârșitul lunii august începe perioada agrotehnică pentru semănatul rapiței.

Sursa: NIMH-BAS