

Noua dăunătoare care afectează ardeiul și arbustul de goji

Автор(и): Растителна защита
Дата: 25.08.2016 Брой: 8/2016



*Agenția Bulgară pentru Siguranța Alimentelor a luat măsuri împotriva unui nou dăunător pentru țară, care atacă în principal plantele de goji și ardei. Specia *Aceria kuko* - acarianul galicol al goji, un acarian eriofid formator de gale pe goji, a fost detectată pentru prima dată în zona orașului Plovdiv, satul Malak Chardak. Toate zonele în care a fost detectată infestarea au fost plasate sub carantină și se implementează măsuri pentru a limita răspândirea dăunătorului.*

La Laboratorul Central de Carantină Vegetală din Sofia, inspectorii fitosanitari ai AFSA au stabilit prezența unei infestări cu acarianul eriofid formator de gale în regiunile Plovdiv, Vidin, Vrața, Varna, Blagoevgrad și Pernik. Sunt afectate în principal plantațiile și pepinierele cu goji și ardei. Măsurile întreprinse pentru limitarea și eradicarea infestării sunt efectuate de Agenția Bulgară pentru Siguranța Alimentelor. Zonele cu plante infestate au fost plasate sub carantină. Este de asemenea interzisă colectarea de butași din plantațiile bolnave. Se

efectuează tăierea și distrugerea părților de plante atacate, precum și tratamente chimice prescrise de specialiștii Agenției. Specia *Aceria kuko* - acarianul galicol al goji - acarian eriofid formator de gale pe goji - a fost detectată pentru prima dată în zona orașului Plovdiv, satul Malak Chardak, au raportat inspectorii.

Acarianul eriofid formator de gale (*Aceria kuko*)

Acarianul eriofid formator de gale pe goji este răspândit în China, Coreea de Nord și Taiwan. În 2011 a fost observat în Slovenia și Germania, iar în 2012 în Grecia și Regatul Unit. În 2015 a apărut și în Ungaria și Cipru. Probabil a fost introdus în țara noastră cu material de plantare infestat din țările vecine. Atacă în principal plantele din specia *Lycium barbarum* (goji), o plantă din familia Solanaceae /Solanacee/. Dăunătorul a fost detectat și pe *Capsicum annuum* L. (ardei) și *Solanum nigrum* L. (pătlăgea neagră). Pagubele provocate de acarieni sunt pe frunzele plantelor atacate, unde formează gale în formă de mărgel, cu diametrul de 3 până la 5 cm; în interiorul acestora se află acarienii, care se hrănesc cu seva plantelor.

Mai multe pe această temă:

Acarieni eriofizi