

Proгноza agrometeorologică pentru luna septembrie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 05.09.2016 Брой: 9/2016



Precipitații semnificative nu sunt așteptate în prima decadă. În majoritatea zilelor perioadei, condițiile vor permite executarea lucrărilor de câmp sezoniere – recoltarea floarea-soarelui și a hibrizilor timpurii de porumb, efectuarea arăturii adânci și a pregătirii solului pre-însămânțare pe suprafețele destinate semănatului cu rapiță de toamnă. Perioada agrotehnică optimă pentru semănatul rapiței este în prima jumătate a lunii septembrie. Pe parcursul lunii, o mare parte a soiurilor de struguri pentru vin roșu, mai devreme decât datele obișnuite, vor atinge maturitatea tehnologică. Se așteaptă o recoltă de struguri cu un conținut ridicat de zahăr.

În septembrie, dezvoltarea culturilor agricole tardive, care au depășit consecințele negative ale secetei prelungite de vară, va decurge la temperaturi în jurul și peste normele climatice. Precipitațiile de la sfârșitul lui august, în unele locuri peste 25-30 l/m² (Vidin, Lom, Lovech, Veliko Tărnovo, Șumen, Silistra, Plovdiv, Sliven), au venit târziu pentru o parte din culturile de primăvară, care, din cauza deficitului de umiditate al solului, și-au

încheiat vegetația prematur. Aceste precipitații au îmbunătățit condițiile pentru dezvoltarea culturilor a doua și a hibrizilor târzii de porumb.

La începutul lui septembrie, hibrizii târzii de porumb vor fi în faza de maturitate lăptoasă, în timp ce cei semi-târzii vor prezenta maturitate largă de ceară și completă.

Precipitații semnificative nu sunt așteptate în prima decadă. În majoritatea zilelor perioadei, condițiile vor permite executarea lucrărilor de câmp sezoniere – recoltarea floarea-soarelui și a hibrizilor timpurii de porumb, efectuarea arăturii adânci și a pregătirii solului pre-însămânțare pe suprafețele destinate semănatului cu rapiță de toamnă. Perioada agrotehnică optimă pentru semănatul rapiței este în prima jumătate a lunii septembrie.

La începutul celei de-a doua decade, este prognozată o scădere semnificativă a temperaturilor, precipitații și un risc crescut pentru dezvoltarea patogenilor care provoacă putregai la recolta de fructe și struguri care se coc – putregaiul cenușiu la struguri (*Botrytis cinerea*), putregaiul brun (*Monilia fructigena*) la fructele soiurilor de pomi fructiferi de toamnă-iarnă.

În a doua jumătate a lunii septembrie, fazele finale de dezvoltare ale culturilor agricole tardive vor decurge în condiții termice obișnuite pentru sfârșitul de vară și începutul de toamnă. Până la sfârșitul celei de-a doua decade, o mare parte a hibrizilor târzii de porumb vor prezenta maturitate de ceară și completă. În a treia decadă, bumbacul va fi într-o fază largă de coacere.

La începutul celei de-a treia decade, precipitațiile prognozate vor îmbunătăți rezervele de umiditate a solului din straturile superioare, ceea ce are o importanță semnificativă pentru desfășurarea normală a fazelor inițiale de vegetație ale rapiței de toamnă. Până la sfârșitul lui septembrie, culturile de rapiță semănate în perioada agrotehnică vor fi în faza de încolțire.

Pe parcursul lunii, o mare parte a soiurilor de struguri pentru vin roșu, mai devreme decât datele obișnuite, vor atinge maturitatea tehnologică. Se așteaptă o recoltă de struguri cu un conținut ridicat de zahăr.

Sursa: INMH - BAN