

Proгноza agrometeorologică pentru luna octombrie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.10.2016 Брой: 10/2016



În octombrie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi și precipitații apropiate de normele climatice. În a doua și la începutul celei de-a treia decadă, condițiile agrometeorologice se vor caracteriza printr-o dinamică sporită. Precipitațiile prognozate vor asigura umiditatea necesară pentru desfășurarea normală a stadiilor inițiale de vegetație ale culturilor semănate de rapiță și cereale de toamnă.

În primele zile ale lunii octombrie, vremea însorită și caldă sezonieră prognozată va accelera finalizarea stadiilor finale de dezvoltare ale culturilor agricole târzii și va fi o premisă pentru sinteza unei cantități mai mari de zaharuri în fructele soiurilor de toamnă ale pomilor fructiferi și ale soiurilor târzii de struguri pentru vin.

La mijlocul primei decade se așteaptă o scădere substanțială a temperaturii și o schimbare semnificativă a condițiilor agrometeorologice. Precipitațiile prognozate în prima săptămână a lunii octombrie, după seceta prelungită de vară, vor îmbunătăți starea hidrofizică a solului din straturile superioare. Precipitațiile de la începutul toamnei s-au distribuit neuniform pe teritoriul țării. În unele locuri din nordul Bulgariei au depășit 40–50 l/m² (Vidin – 44 l/m², Vrața – 46 l/m², Loveci – 70 l/m², Pleven – 44 l/m², Sviștov – 45 l/m², Razgrad – 52 l/m², Dobrici – 42 l/m²). În majoritatea sudului Bulgariei precipitațiile au fost nesemnificative – sub 10 l/m². În regiunile sudice, solul uscat și compactat a îngreunat realizarea operațiunilor sezoniere de lucrare a solului.

În prima decadă a lunii octombrie se așteaptă o îmbunătățire a condițiilor pentru efectuarea lucrărilor pregătitoare pentru semănat și pentru semănarea culturilor de cereale de toamnă. În această perioadă se încadrează fereastra agrotehnică pentru semănatul grâului în nordul Bulgariei; din 15 până în 25 octombrie – pentru sudul Bulgariei; iar în a treia decadă – pentru zonele de lângă coasta Mării Negre. În a doua și la începutul celei de-a treia decadă, condițiile agrometeorologice se vor caracteriza printr-o dinamică sporită. Precipitațiile prognozate vor asigura umiditatea necesară pentru desfășurarea normală a stadiilor inițiale de vegetație ale culturilor semănate de rapiță și cereale de toamnă.

În ultima săptămână a lunii, dezvoltarea culturilor de toamnă va avea loc într-un ritm mai lent. La sfârșitul lunii octombrie, la grâul și orzul semănat în a doua jumătate a lunii, stadiul predominant de creștere va fi încolțirea. În culturile semănate în prima decadă a lunii octombrie, stadiul celei de-a treia frunze va fi observat pe scară largă. Cele mai timpurii culturi de cereale de toamnă, semănate în a treia decadă a lunii septembrie, vor atinge începutul încălțării până la sfârșitul lunii octombrie. În culturile de rapiță de toamnă semănate în septembrie (în regiunile Cearpan, Iambol, Sliven, Stara Zagora), se va observa stadiul de formare a rozetei.

Sursa: INMH-BAS