

# Gândacul de varză care formează gălbenușe (*Ceutorrhynchus pleurostigma*)

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 29.11.2016 Брой: 11/2016



*Ceutorrhynchus pleurostigma* este un mic gândac, un curculionid, cu o lungime de aproximativ 3 mm. Corpul său este alungit-oval, de culoare neagră, acoperit în zona toracică cu peri cenușii și solzi gălbui. Pronotul este punctat și acoperit cu peri galbeni. Pe elitre se află rânduri longitudinale de solzi cenușii. Lungimea corpului este de 2,5 — 3 mm. Oul este oval, alb și are 0,35 mm lungime. Larvă este albă, arcuită, cu capul maro, fără picioare, având 3—4,5 mm lungime. Pupa este liberă, albă și are 3,7 mm lungime.

Acesta este un dăunător care atacă rădăcinile varzei. Pe lângă varză, atacă și gulie, nap și ridiche. Pagubele sunt provocate de adult și de larvă. Insectele adulte roade frunzele, părțile florale, tulpinile și rădăcinile, în timp ce larva induce formarea de umflături (gale) pe rădăcina principală sub suprafața solului. Plantelor de varză infestate le formează căpățâni mai mici.

Larvele iernează în gale (hrănindu-se în interiorul acestora timp de 5–6 luni) și în sol. Gândacii apar în iunie. Curculionidul galigen al varzei dezvoltă o generație pe an și apare în două rase biologice care sunt similare din punct de vedere morfologic. O rasă — rasa de primăvară, iernează ca insectă adultă și se dezvoltă pe plante crucifere sălbatice. Cealaltă rasă — rasa de vară, iernează ca larvă în principal în tulpinile de varză deteriorate și este asociată cu plantele crucifere cultivate.

## Lupta

Măsurile de combatere includ: colectarea și distrugerea plantelor infestate; smulgerea tulpinilor de varză toamna și distrugerea lor împreună cu larvele; distrugerea buruienilor din jurul culturilor. În cazul apariției în masă a adulților, se poate efectua stropire cu Agria 1050 - 150 ml/da și Nurelle Dursban - 80 ml/da.