

Condițiile agrometeorologice sunt favorabile pentru aratul adânc și tăierea pomilor în cultura mărului și a părului.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 25.12.2016 Брой: 12/2016



La începutul iernii, evaluările stării culturilor semănate toamna sunt variate. Starea cerealelor de toamnă și a rapiței de toamnă în nordul Bulgariei este mai bună. În regiunile extreme sudice, ca urmare a deficitului de umiditate al solului, unele suprafețe cu grâu s-au uscat în stadiul de încolțire. În perioada următoare, în majoritatea regiunilor de câmp, condițiile vor permite aratul adânc și tăierea pomilor fructiferi sămburoși rezistenți la frig (măr, păr).

În majoritatea zilelor următoarei perioade de șapte zile, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de vreme relativ uscată și temperaturi peste normele climatice pentru cea de-a treia decadă a lunii decembrie. În regiunile de câmp, temperaturile medii zilnice vor fi în intervale care

vor menține culturile semănate toamna în stare de repaus. La grâu și orz, vor predomina stadiile de a treia frunză și încovoietură, iar la rapița de toamnă – stadiul de rozetă.

La începutul iernii, evaluările stării culturilor semănate toamna sunt variate – de la bună la nesatisfăcătoare și slabă. Starea cerealelor de toamnă și a rapiței de toamnă în nordul Bulgariei este mai bună. În unele locuri din sudul Bulgariei, seceta prelungită de toamnă este motivul pentru densitatea neuniformă a suprafețelor și vegetația întârziată a culturilor. Înălțimea unei părți a suprafețelor cu cereale de toamnă este de 5–6 cm, iar a rapiței – de 10–12 cm.

În regiunile extreme sudice, ca urmare a deficitului de umiditate al solului, unele suprafețe cu grâu s-au uscat în stadiul de încolțire.

În perioada următoare, în majoritatea regiunilor de câmp, condițiile vor permite aratul adânc și tăierea pomilor fructiferi sâmburoși rezistenți la frig (măr, păr).

Sursa: NIMH-BAS