

Proгноza agrometeorologică pentru ianuarie 2017

Автор(и): Растителна защита
Дата: 12.01.2017 Брой: 1/2017



În cursul lunii, temperaturile minime prognozate, local până la minus 12°C, în condiții fără strat de zăpadă și cu persistență mai îndelungată, vor fi critice pentru culturile de cereale de toamnă care nu au intrat în faza de încolțire în timpul vegetației de toamnă. Aceste valori vor amenința, de asemenea, cu înghețul, plantațiile întârziate de rapiță de toamnă care, ca urmare a secetei toamnei, nu au format o rozetă (de 7–8 frunze) – o fază în care plantele au o rezistență crescută la frig. Temperaturile scăzute din ianuarie vor pune la încercare, de asemenea, rezistența la iarnă a unor culturi perene. Valorile sub minus 17–18°C vor prezenta un risc pentru mugurii de viță de vie, în special pentru soiurile de struguri de masă, iar sub minus 20–21°C – pentru mugurii fructiferi ai unei mari părți din soiurile de piersic.

În ianuarie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi sub normele climatice, ceea ce va menține culturile semănate toamna și plantațiile perene în stare de repaus.

O mare parte a plantațiilor de grâu și orz va trece iarna în stadiile de creștere ale celui de-al treilea frunz și al încolțirii. Excepții se vor observa la cerealelor de toamnă semănate târziu, semănate în a doua jumătate a lunii noiembrie, care și-au încetat vegetația în stadiile de încolțire și formare inițială a frunzelor. Acestea sunt slabe, insuficient întărite și vor fi cele mai vulnerabile la impactul temperaturilor scăzute din ianuarie.

În cursul lunii, temperaturile minime prognozate, local până la minus 12°C, în condiții fără strat de zăpadă și cu persistență mai îndelungată, vor fi critice pentru culturile de cereale de toamnă care nu au intrat în faza de încolțire în timpul vegetației de toamnă. Aceste valori vor amenința, de asemenea, cu înghețul, plantațiile întârziate de rapiță de toamnă care, ca urmare a secetei toamnei, nu au format o rozetă (de 7–8 frunze) – o fază în care plantele au o rezistență crescută la frig.

În perioadele scurte, relativ mai calde ale lunii, când se prognozează temperaturi maxime de până la 10–15°C, în regiunile sudice o parte din culturile de cereale de toamnă va trece de la repaus profund la repaus relativ, dar reluarea proceselor vegetative în plantații este puțin probabilă.

Precipitațiile așteptate, apropiate de norma pentru ianuarie, vor spori rezervele de umiditate din sol în straturile de 50 cm și 100 cm. La începutul iernii, în unele locuri din Câmpia Dunării (stația agrometeorologică Novacene) și în parte din regiunile sudice (stația agrometeorologică Haskovo) nivelul rezervelor de umiditate din stratul de un metru de sol era scăzut pentru sezon, sub 70% din capacitatea de câmp (CC).

Prognoză agrometeorologică săptămânală pentru perioada 06–13.01.2017

În majoritatea zilelor următoarei perioade de șapte zile, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi sub normal. La începutul perioadei, se așteaptă ninsoare și formarea unui strat permanent de zăpadă în majoritatea regiunilor arabile ale țării. Acesta va oferi protecție culturilor semănate toamna împotriva impactului temperaturilor negative scăzute, local sub minus 17–20°C, care sunt prognozate la sfârșitul primei și începutul celei de-a doua decadă a lunii ianuarie. În absența stratului de zăpadă și cu o persistență mai îndelungată, aceste valori vor fi critice nu numai pentru cerealelor de toamnă semănate târziu care și-au încetat vegetația în stadiile de încolțire și al treilea frunz, ci și pentru o parte din plantațiile aflate în faza de încolțire. Temperaturile de acest ordin, în condiții fără strat de zăpadă, vor amenința cu înghețul și rapița de toamnă, în special plantațiile care nu au reușit să formeze o rozetă în timpul vegetației de toamnă.

Temperaturile scăzute din ianuarie vor pune la încercare, de asemenea, rezistența la iarnă a unor culturi perene. Valorile sub minus 17–18°C vor prezenta un risc pentru mugurii de viță de vie, în special pentru soiurile de struguri de masă, iar sub minus 20–21°C – pentru mugurii fructiferi ai unei mari părți din soiurile de piersic. În regiunile unde s-au înregistrat temperaturi critice pentru vița de vie, se recomandă prelevarea la timp a unor probe pentru a determina posibilele daune cauzate de îngheț, în vederea definirii abordării corecte la efectuarea tăierii viitoare.

Sursa: NIMH-BAS