

Cine provoacă căderea prematură a fructelor de prun?

Автор(и): Растителна защита
Дата: 06.02.2017 Брой: 2/2017



Prunii înfloresc abundant, dar din luna mai până la recoltare există perioade de cădere prematură a fructelor formate și a fructelor, ceea ce reduce semnificativ producția. Dacă se cunosc cauzele acestui fenomen, unele dintre ele ar putea fi prevenite.

- Fructele tinere cad la scurt timp după înflorire. Cauză – lipsa semințelor din cauza fertilizării incorecte sau degenerării ovulelor.
- Fructele tinere cad (căderea din iunie) – din a doua jumătate a lunii mai până în prima jumătate a lunii iulie. Cauză – acumularea insuficientă de asimilați în plante în anul precedent și deficitul de apă.
- Fructele cad împreună cu peduncul, au două găuri și un miros de ploșniță de casă. Căderea începe în mai și se încheie la începutul lunii iunie. Cauză – musca neagră a fructului de prun și musca galbenă a fructului de prun.

- Fructele cad în a doua jumătate a lunii iunie și la începutul lunii iulie. În sămânța fructelor căzute se află o larvă albicioasă cu cap brun, fără picioare și cu corpul ascuțit la ambele capete. Cauză – insectele care se hrănesc cu semințe din genul Eurytoma.
- Căderea fructelor înainte de recoltare. Cauză – dezechilibrul între auxine și etilenă.