

Proгноza agrometeorologică pentru luna februarie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.02.2017 Брой: 2/2017



În februarie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi în jurul și sub normele climatice. Pe parcursul lunii, temperaturile minime prevăzute, în intervalul minus 14–19°C, vor testa din nou rezistența la iarnă a unei părți din culturile agricole de iarnă. Condiții favorabile pentru tăieri în livezi și vii vor apărea în prima jumătate a lunii.

Temperaturile scăzute negative din ianuarie au provocat, în grade diferite, avarii din îngheț la pomii fructiferi și la viță de vie în multe locuri din sud-vestul Bulgariei.

După vremea înghețată din ianuarie, se prognozează o creștere a temperaturilor pentru prima decadă a lunii februarie, însă valorile lor medii zilnice vor rămâne în limite care vor menține culturile semănate toamna în stare de repaus profund.

În a doua decadă, se așteaptă o îmbunătățire mai substanțială a condițiilor de temperatură, iar o parte din culturile de cereale de iarnă din regiunile sudice ale țării vor trece de la repausul profund la cel relativ.

În perioadele mai calde ale celei de-a doua și a treia decade, când se prognozează temperaturi maxime peste 14–15°C, valorile medii zilnice – în unele locuri din regiunile sudice și de sud-est – se vor apropia de minimul biologic necesar pentru reluarea proceselor vegetative la culturile de cereale de iarnă. În unele locații, la grâu și orz, pot apărea condiții pentru o vegetație slab exprimată, dar aceasta nu va duce la o schimbare a stării fenologice a culturilor. La sfârșitul lunii februarie, culturile de cereale de iarnă se vor afla în stadiile de creștere ale celui de-al treilea frunză și înrourire.

Temperaturile prognozate în a treia decadă a lunii februarie vor perturba repausul forțat la o parte din culturile fructifere. La speciile de sâmbure cu înflorire timpurie (migdal, cais, piersic, cireș) în regiunile de câmpie ale țării, va apărea umflarea mugurilor.

Precipitațiile din februarie, în jurul și sub norma lunară, vor spori rezervele de umiditate a solului și în stratul de doi metri. Ca urmare a precipitațiilor peste normă din ianuarie (Vrața 76 l/m², Veliko Tărnovo 78 l/m², Varna 66 l/m², Dobrici 57 l/m², Plovdiv 66 l/m², Kardjali 62 l/m², Haskovo 120 l/m², Șirpan 74 l/m², Stara Zagora 79 l/m², Burgas 58 l/m²), după topirea zăpezii, se așteaptă ca rezervele de umiditate a solului în stratul de un metru în majoritatea țării să atingă niveluri apropiate de capacitatea de câmp (CC).

În februarie, condiții mai potrivite pentru efectuarea tăierilor în vii și livezi vor apărea în prima jumătate a lunii. În zonele unde s-au înregistrat temperaturi minime sub minus 17–18°C (Vidin, Kneaja, Șumen, Pazardjik, Plovdiv, Stara Zagora, Șirpan), tăierea viței de vie ar trebui efectuată mai târziu, după stabilirea eventualelor avarii din îngheț.

În a doua jumătate a lunii, ploile frecvente prognozate vor menține straturile superioare de sol suprasaturate cu apă în multe părți ale țării, ceea ce va îngreuna fertilizarea de sus a culturilor semănate toamna cu îngrășăminte minerale azotate.

Sursa: INMH-BAS