

Mucegaiul de frunze la roșii

Автор(и): Растителна защита
Дата: 20.02.2017 Брой: 2/2017



*Mucegaiul frunzelor este o boală care atacă roșiile cultivate în sere sau tuneluri din plastic. Cu toate acestea, atunci când vremea este foarte umedă, aceasta se observă și în culturi deschise și în grădini. Agent cauzal – *Cladosporium fulvum*.*

Primele simptome vizibile ale bolii trebuie căutate pe frunzele de la etajele inferioare ale plantelor. Pe partea superioară a frunzelor se observă pete palide, difuze; pe partea inferioară se formează o pătură ușoară, iar mai târziu catifelată. Pe o singură frunză se pot dezvolta mai multe pete. Țesuturile afectate devin necrotice, iar în cazul unei infestări severe, frunzele deteriorate cad.

Strategii de combatere a dăunătorului:

- Asigurați o bună ventilație în sere, o umiditate a aerului sub 70% și o temperatură de 18-22°C.
- Fertilizare minerală echilibrată;

- Regim hidric și de aer favorabil;
- Soiuri rezistente;
- Dezinfectarea solului după sfârșitul perioadei de vegetație;
- La apariția bolii, tratați cu unul dintre fungicidele autorizate.

Produse fitosanitare autorizate:

SYNSTAR – 70-80 ml/ha și CIDELY TOP – 100 ml/ha, SINGUN – 100-150 g/ha (autorizația sa expiră la 09.06.2017).