

Trips în roșii și castraveți

Автор(и): Растителна защита
Дата: 20.02.2017 Брой: 2/2017



Pe organele plantelor atacate (frunze, pețioluri, flori și fructe) se formează mici pete albicioase cu puncte întunecate, care reprezintă excrementele dăunătorului. La densități mari ale populației, petele se contopesc. În sere sunt dăunători următorii:

Tripsul tutunului *Thrips tabac* – se găsește în principal pe frunziș, atacând mai rar florile. Condiții favorabile pentru dezvoltarea sa sunt temperaturile ridicate și umiditatea scăzută a aerului.

Tripsul californian (al florilor) *Franklinella occidentalis* – s-a constatat că la castraveți dăunătorul preferă florile. Organele generative ale plantelor (mugurii și ovarile), atacate în stadiile timpurii de dezvoltare, se usucă și cad.

Tripsul de seră *Heliothrips haemorrhoidalis* – larvele și adulții sug seva din frunzele plantelor. Umiditatea relativă scăzută a aerului are un efect advers asupra activității vitale a populației.

Strategia de combatere a dăunătorilor: Pe lângă inspecția regulată a plantelor pentru a determina prezența și densitatea populației dăunătorilor, trebuie plasate capcane adezive albastre.

Produse fitosanitare autorizate:

- împotriva tripsilor: DEKA EC / DESHA EC / DENA EC - 30 ml/ha, KARATE EXPRESS WG / NINJA / FORZA - 42-80 g/ha, METEOR - 60-70 ml/100 l apă și NATURALIS - 75-100 ml/ha.
- împotriva tripsului californian: FURY 10 EC - 0,015%

Pentru roșii:

- împotriva tripsilor: DICARZOL 10 SP - 556 g/ha.
- împotriva tripsului californian: SYNEIS 480 SC - 10-37,5 ml/ha.

Pentru castraveți:

- împotriva tripsului tutunului: LANAT 25 WP - 80-100 g/ha.
- împotriva tripsului californian: SYNEIS 480 SC - 10-25 ml/ha.