

Proгноza agrometeorologică pentru prima jumătate a lunii martie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 05.03.2017 Брой: 3/2017



În prima jumătate a lunii martie, condițiile agrometeorologice vor fi caracterizate prin dinamică crescută. După scăderea de scurtă durată a temperaturilor de la începutul lunii, se așteaptă o îmbunătățire semnificativă a condițiilor termice în prima săptămână a lunii martie. Temperaturile prognozate peste normal, cu valori maxime de până la 20°C, vor conduce la activarea vegetației la culturile semănate toamna și la culturile pomicele cu înflorire timpurie din regiunile agricole ale țării.

Temperaturile maxime ridicate de la sfârșitul lunii februarie, atingând în unele locuri 21-23°C (Vidin, Vrața, Loveci, Veliko Tărnovo, Pazardjik), au reluat procesele vegetative la grâu, orz și rapiță de toamnă și au perturbat odihna forțată la o parte din plantațiile perene.

În prima jumătate a lunii martie, condițiile agrometeorologice vor fi caracterizate prin dinamică crescută. După scăderea de scurtă durată a temperaturilor de la începutul lunii, se așteaptă o îmbunătățire semnificativă a condițiilor termice în prima săptămână a lunii martie. Temperaturile prognozate peste normal, cu valori maxime de până la 20°C, vor conduce la activarea vegetației la culturile semănate toamna și la culturile pomicole cu înflorire timpurie din regiunile agricole ale țării.

La sfârșitul primei decade și în prima jumătate a celei de-a doua decade, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi în jurul și sub normele climatice, ceea ce va restricționa dezvoltarea culturilor agricole. În nordul Bulgariei și în câmpiile înalte, unde nu se exclud precipitații, inclusiv zăpadă, se va observa atenuarea și încetarea vegetației la culturile semănate toamna. În sudul Bulgariei, valorile temperaturilor medii zilnice vor fi apropiate de minimul biologic necesar pentru dezvoltarea culturilor de cereale de toamnă și a rapiței de toamnă.

Până la mijlocul lunii martie, la culturile pomicole din regiunile sudice ale țării, la speciile cu înflorire timpurie (migdal, cais, piersic), vor apărea fazele de umflare și de deschidere a mugurilor. Pe parcursul perioadei, nu sunt prognozate temperaturi minime critice pentru culturile din câmpie.

Precipitațiile frecvente din prima jumătate a lunii vor împiedica, în multe părți ale țării, implementarea la timp a activităților agrotehnice sezoniere – fertilizarea de întărire a culturilor semănate toamna cu îngrășăminte minerale azotate, pregătirea solului înainte de semănat și semănatul culturilor de primăvară timpurii (măzăriche, ovăz, mazăre, orz de primăvară). Condiții mai potrivite pentru efectuarea stropirilor premergătoare înfloririi în livezi vor apărea în prima săptămână a lunii martie și la începutul celei de-a doua decade.

Sursa: NIMH-BAS