

Proгноza agrometeorologică pentru a doua jumătate a lunii martie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 17.03.2017 Брой: 3/2017



Sfârșitul lunii martie se așteaptă să aducă o creștere a temperaturilor și o accelerare a ritmurilor de dezvoltare ale culturilor agricole. La cerealele de toamnă se va observa o creștere a coeficientului de încălzire. Unele dintre speciile cu înflorire timpurie (migdal, cais, piersic) vor intra în fazele de boboc de floare, iar localitățile din regiunile sudice – și începutul fazei de înflorire. Condiții pentru efectuarea tratamentelor premergătoare înfloririi la pomii fructiferi din zonele de câmpie ale țării vor fi prezente în cursul celei de-a treia decadă.

Manifestările întârziate ale vremii de iarnă de la începutul celei de-a doua decade a lunii martie au încetinit, iar în regiunile din nord-est și în câmpiile înalte, unde s-a format un strat subțire de zăpadă (Razgrad - 8 cm, Dobrich - 1 cm, Sofia - 2 cm, Dragoman - 8 cm), au oprit temporar dezvoltarea culturilor de toamnă.

În primele zile ale perioadei, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi medii zilnice apropiate de norma pentru a doua decadă a lunii martie și de minimul biologic necesar vegetației grâului, orzului

și rapiței de toamnă. Excepții se vor observa în localități din Bulgaria de Sud, unde se așteaptă temperaturi mai ridicate.

La sfârșitul celei de-a doua și începutul celei de-a treia decade, se așteaptă o creștere semnificativă a temperaturilor și o activare a proceselor vegetaționale la culturile de toamnă și plantațiile perene. La culturile de cereale de toamnă, faza de încălțire va decurge masiv. La culturile pomicole, se vor observa fazele de umflare a mugurilor și de deschidere a mugurilor. În regiunile sudice, vița de vie va trece prin faza de plâns (scurgerea sevei).

În a doua jumătate a celei de-a treia decade, se prognozează o deteriorare pe termen scurt a condițiilor termice. În localități din Bulgaria de Nord și din câmpiile înalte, nu pot fi excluse căderi de zăpadă și condiții pentru o pauză în vegetația culturilor de toamnă. La sfârșitul lunii martie se așteaptă o creștere a temperaturilor și o accelerare a ritmurilor de dezvoltare ale culturilor agricole. La cerealele de toamnă se va observa o creștere a coeficientului de încălțire. Unele dintre speciile cu înflorire timpurie (migdal, cais, piersic) vor intra în fazele de boboc de floare, iar localitățile din regiunile sudice – și începutul fazei de înflorire.

În a doua jumătate a lunii martie, nu se prognozează temperaturi minime critice pentru culturile agricole. Precipitațiile așteptate în cursul perioadei vor spori rezervele de umiditate a solului din stratul de doi metri. Precipitațiile căzute până la mijlocul lunii martie, în multe localități din țară peste 35-45 l/m², iar în unele regiuni din Bulgaria de Nord – peste 50 l/m² (Vrața - 57 l/m², Pleven - 56 l/m², Veliko Tărnovo - 58 l/m², Sviștov - 61 l/m², Ruse - 60 l/m², Șumen - 77 l/m², Razgrad - 55 l/m², Varna - 56 l/m²), au crescut rezervele de umiditate a solului din stratul de un metru. În majoritatea suprafețelor de câmp, acestea au atins niveluri până la capacitatea de câmp (CC).

Până la sfârșitul celei de-a doua și începutul celei de-a treia decade a lunii martie, conținutul ridicat de umiditate din straturile superioare ale solului în multe localități din țară va întârzia lucrările de pregătire premurgătoare însămânțării suprafețelor destinate semănatului cu culturi de primăvară mediu-timpurii. Din acest motiv, în unele părți din Bulgaria de Sud, termenele agrotehnice pentru semănatul floarea-soarelui în a doua jumătate a lunii martie nu vor fi respectate.

Condiții pentru efectuarea tratamentelor premurgătoare înfloririi la pomii fructiferi din zonele de câmpie ale țării vor fi prezente în cursul celei de-a treia decadă.

Sursa: INMH-BAS