

Aprilie a surprins din nou pomii fructiferi

Автор(и): Растителна защита
Дата: 21.04.2017 Брой: 4/2017



Condițiile meteorologice de iarnă de la sfârșitul ultimei perioade de șapte zile, cu ninsoare în câmpiile înalte și în unele locuri din nordul Bulgariei, au provocat daune ireparabile unei părți din pomii fructiferi.

În majoritatea zilelor perioadei următoare, 21–27 aprilie, dezvoltarea culturilor agricole va progresa într-un ritm încetinit, la temperaturi sub norma pentru a treia decadă a lunii aprilie. În prima jumătate a perioadei se prognozează din nou înghețuri la sol, care trebuie luate în considerare la întărirea răsadurilor de legume și tutun.

Precipitațiile răspândite de la sfârșitul celei de-a doua decade a lunii aprilie, care în multe părți ale țării au depășit norma medie pentru perioada de 35–40 l/m² (Novo Selo - 51 l/m², Vrața - 37 l/m², Montana - 39 l/m², Veliko Tărnovo - 43 l/m², Ruse - 43 l/m², Silistra - 40 l/m², Dobrici - 37 l/m², Sofia - 50 l/m², Blagoevgrad - 41 l/m², Elhovo - 35 l/m²), au condus la o creștere substanțială a rezervelor de umiditate a solului în stratul de 50 cm. Acestea vor avea o importanță excepțională pentru grâu și orz, care se află în faze critice din punct de

vedere al umidității – înălțarea tulpinii și trecerea de la înălțarea tulpinii la înspicat. Spre sfârșitul perioadei, orzul în unele locuri din regiunile cele mai sudice va intra în stadiul incipient de înspicat. La rapiță se va observa înflorirea în masă, iar la floarea-soarelui și porumb – încolțirea și formarea frunzelor.

Vremea răcoroasă și umedă de la începutul celei de-a treia decade va fi o premisă pentru creșterea fondului infecțios al unei serii de boli fungice, cum ar fi: putregaiul brun timpuriu și tăiașul la pomii fructiferi, excorioza la viță de vie, septorioza la culturile de cereale, mană la ceapă, etc.

În cursul perioadei, în multe părți ale țării, condițiile vor fi nepotrivite pentru efectuarea lucrărilor de pregătire a solului și pentru semănarea culturilor de primăvară termofile mai târzii, cum ar fi bumbacul, arahidele, fasolea, pepenele verde și pepenele galben.

Sursa: INMH-BAS