

Practici de protecție a plantelor în iunie pentru vii

Автор(и): гл.експерт Татяна Величкова, Дирекция "Оценка на риска по хранителната верига", ЦОРХВ

Дата: 13.06.2017 Брой: 6/2017



În această perioadă, vița de vie se află în fenofaza „înflorire deplină” până la fenofaza „boabe mărimea unui bob de mazăre” - „închiderea ciorchine”

Principalele dăunători pentru perioadă

Mană viței de vie *Plasmopara viticola*

Făinarea viței de vie *Oidium tuckeri*

Mucegaiul cenușiu *Botrytis cinerea*

Viermele strugurilor *Lobesia botrana*

Păduchele bălții viței de vie *Pulvinaria vitis*

Păianjenul galben al viței de vie *Schizotetranychus viticola*

Mucegaiul cenușiu

În fenofaza „înflorire deplină”, pe flori și pe pedunculii florali se formează pete maronii, acoperite cu sporul patogenului. Aceste simptome sunt cunoscute sub numele de mucegai cenușiu timpuriu.

Strategia de combatere: În vreme ploioasă și caldă, imediat după înflorire, la apariția primelor boabe și la închiderea ciorchinelor, se efectuează pulverizări cu unul dintre produsele fitosanitare omologate.

Produse fitosanitare autorizate: arvak 50 WG - 100-150 g/ha; geox WG - 100 g/ha; driza WG - 100-150 g/ha; cabrio top – 0.2%; cantus - 100 g/ha; mevalon - 160-400 ml/ha; proletus 50 WG - 120 g/ha; rebut WG - 100-150 g/ha; sabueso - 100-150 g/ha; synpro - 150 ml/ha; switch 62.5 WG - 0.08%; thiram 80 WG – 0.4%; top plus 70 WP – 0.1%; topsin M 70 WDG – 0.1%; folder 80 WG - 150 g/ha; follow 80 WG / friller 80 WG / flowet 80 WG - 187.5 g/ha; folpan 80 WDG - 0.1 % + ardent 50 SC - 0.015 %; shavit F 72 WDG – 0.2%.

Viermele strugurilor

În luna iunie zboară fluturii celei de-a doua generații a dăunătorului. Aceștia își depun ouăle pe boabe de mărimea unui bob de mazăre (primele boabe). Larvele afectează primele boabe, rozând și consumând interiorul boabelor împreună cu semințele. Boabele afectate sunt legate slab cu fire de mătase. O larvă afectează între 7 și 24 de boabe.

Strategia de combatere: Tratamentele trebuie efectuate la **Pragul Economic de Intervenție (PEI)**: pentru soiurile de struguri de masă 6-7 larve la 100 de boabe mărimea unui bob de mazăre, iar pentru soiurile de struguri de vin 11-12 larve la 100 de boabe mărimea unui bob de mazăre.

Produse fitosanitare autorizate: aficar 100 EC – 40 ml/ha; dascor 440 - 50 ml/ha; decis 100 EC - 12.5-17.5 ml/ha; dipel 2 X - 0.1 %; dukat 25 EC - 70 ml/ha; efcimetrin 10 EC / cyper 10 - 40 ml/ha; karate zeon 5 CS – 0.02%; coragen 20 SC - 18 ml/ha; luzindo 40 WG - 0.025 kg/ha; mageos - 10 g/ha; maltoato - 40-60 ml/ha; nexcid 015 CS - 0.03 %; nurelle D / chlorsirin 550 EC / samba - 60 ml/ha; runner 240 SC - 0.04 %; rapax - 75-

100 ml/ha; reldan 40 EC - 0.12 %; sineis 480 SC - 4-18 ml/ha; sumi alpha 5 EC / sumicidin 5 EC - 0.025 %;
forey 48 B - 0.15 %; fury 10 EC - 0.0125 %; ciklon 10 EC - 40 ml/ha; cyperfor 100 EC - 40 ml/ha; citrin max /
cyperkyl 500 EC / cypert 500 EC / poli 500 EC - 6 ml/ha; sherpa 100 EW / aficar 100 / cyperfor 100 EW / ciklon
100 EW - 25 ml/ha; sherpa 100 EC - 40 ml/ha.