

Timpul recoltării

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.07.2017 Брой: 7/2017



După valurile de căldură din iunie, în primele zece zile ale lunii iulie se așteaptă o normalizare a condițiilor termice. Precipitațiile prognozate la începutul lunii vor îmbunătăți condițiile pentru vegetația culturilor de primăvară, o mare parte dintre acestea intrând în fazele reproductive ale dezvoltării lor. Pe parcursul lunii, temperaturile maxime extrem de ridicate prognozate, în intervalul 38-42°C, combinate cu umiditatea atmosferică scăzută, vor avea un impact negativ asupra înfloririi și fertilizării la floarea-soarelui, porumb și culturile legumicole (roșii, castraveți, ardei, dovlecei).

În iulie, dezvoltarea culturilor agricole va decurge la temperaturi în jurul și peste normele climatice, iar în multe locuri din zonele de câmpie – în condiții de deficit de umiditate a solului. **Vremea uscată prognozată în majoritatea zilelor lunii va impune aplicarea unui regim de irigare adecvat pentru culturile de primăvară,**

cu rate sporite de irigare în regiunile nord-vestice și sudice ale țării, unde rezervele de umiditate a solului în stratul de 50 cm la începutul verii sunt reduse - sub 50-55% din capacitatea de câmp (CC).

După valurile de căldură din iunie, în primele zece zile ale lunii iulie se așteaptă o normalizare a condițiilor termice. Precipitațiile prognozate la începutul lunii vor îmbunătăți condițiile pentru vegetația culturilor de primăvară, o mare parte dintre acestea intrând în fazele reproductive ale dezvoltării lor.

În primele două decade, la porumb vor avea loc următoarele faze: înălțarea, înflorirea și formarea mătasei. În a treia decadă, o parte dintre hibridii timpurii de porumb din suprafețele de câmp vor intra în faza de coacere lăptoasă.

În iulie, floarea-soarelui va trece prin fazele de înflorire, fertilizare și umplere a bobului. Sfârșitul lunii va marca, în unele culturi din Câmpia Dunării și în regiunile extreme estice și sudice, începutul fazei de coacere. În a treia decadă, bobul de câmp din zonele de câmpie își va finaliza dezvoltarea.

Pe parcursul lunii, temperaturile maxime extrem de ridicate prognozate, în intervalul 38-42°C, combinate cu umiditatea atmosferică scăzută, vor avea un impact negativ asupra înfloririi și fertilizării la floarea-soarelui, porumb și culturile legumicole (roșii, castraveți, ardei, dovlecei).

Condițiile agrometeorologice din iulie vor limita dezvoltarea unui număr de boli fungice la culturile agricole, cu excepția făinăriilor. Vremea uscată și caldă va fi o premisă pentru creșterea populației anumitor dăunători - acarieni. La culturile pomicele, activitatea dăunătoare a celei de-a doua generații de molii ale fructelor nu trebuie subestimată. Pe parcursul lunii, tratamentele de protecție a plantelor ar trebui efectuate în orele mai răcoroase ale zilei. Pentru iulie se prognozează o probabilitate crescută de grindină. În cazul avariilor produse de grindină, este indicat ca culturile pomicele și legumicole afectate să fie tratate cât mai curând cu fungicide cuprifere adecvate.

Condiții mai favorabile pentru desfășurarea celei mai importante activități sezoniere – recolta grâului – vor apărea la mijlocul primei, în prima jumătate a celei de-a doua și în majoritatea zilelor celei de-a treia decade. Se așteaptă o recoltă bună de boabe.

Sursa: NIMH-BAS