

Îngrijirea protecției plantelor în iulie în vii

Автор(и): гл.експерт Татяна Величкова, Дирекция "Оценка на риска по хранителната верига", ЦОРХВ

Дата: 06.07.2017 Брой: 7/2017



În această perioadă, vița de vie se află în stadiul fenologic de la „sfârșitul înfloririi” până la „începutul coacerii boabelor” la soiurile timpurii.

Principalii dăunători pentru perioadă

Mană vița-de-vie *Plasmopara viticola*

Făinarea viței-de-vie *Oidium tuckeri*

Putregaiul cenușiu *Botrytis cinerea*

Cancerul bacterian al viței-de-vie *Agrobacterium vitis*

Viermele strugurilor *Lobesia botrana*

Flutura viței-de-vie *Theresimima ampellophaga*

Păduchele mănós al viței-de-vie *Pulvinaria vitis*

Păianjenul galben al viței-de-vie *Schizotetranychus viticola*

Cancerul bacterian al viței-de-vie

La plantele infectate pe părțile lignificate, aproape de suprafața solului sau imediat sub aceasta, se observă umflături (tumoare). Plantele bolnave prezintă creștere împiedicată, frunze clorotice și sunt ușor afectate de îngheț într-o iarnă rece.

Strategia de combatere a dăunătorilor:

În luna iulie, vițele care prezintă simptome ale bolii trebuie marcate.

Păduchele mănós al viței-de-vie

Eclozarea larvilor continuă în prima jumătate a lunii iulie. Acestea provoacă daune prin suga sevelor din frunze, lăstari și ciorchini. Își năpârlesc o dată, se hrănesc o anumită perioadă, apoi părăsesc locurile de hrănire și se deplasează către locurile de iernare. Ca urmare a daunelor, vițele de vie se subțiază.

Strategia de combatere a dăunătorilor:

Lupta chimică se efectuează împotriva larvelor tinere.

Produs fitosanitar autorizat:

movento 100 sc - 0,075-0,095%;

