

Gândacul de scoarță al molidului este o amenințare gravă pentru pădurile de pin.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 17.07.2017 Брой: 7/2017



Un număr tot mai mare de păduri de pin din Bulgaria sunt afectate de gândacul scoarțar al pinului, care provoacă uscarea rapidă și pe scară largă a arboretelor de conifere. Experții din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Silvicultură și ai Agenției Executive pentru Silvicultură au discutat măsuri urgente pentru limitarea atacurilor acestui dăunător periculos. Unul dintre motivele principale ale apariției în masă a gândacului scoarțar al pinului este schimbarea climatică, care duce la secetă și face arborii ușor susceptibili la diverși patogeni și dăunători.

La sfârșitul săptămânii trecute, la inițiativa viceministrului agriculturii, alimentației și silviculturii, Atanas Dobrev, și a conducerii Agenției Executive pentru Silvicultură, a avut loc o întâlnire. Experții în știința pădurilor au discutat

în detaliu pagubele provocate de gândacul scoarțar al pinului și ce măsuri urgente trebuie luate imediat.

Măsurile includ accelerarea procesului de atribuire a executării tăierilor sanitare și obligatorii, precum și implicarea tuturor părților interesate în procesul de combatere a dăunătorului. Este extrem de important ca toți proprietarii de păduri, inclusiv cei privați, să participe la lupta împotriva acestui dăunător forestier. În acest scop, vor fi organizate seminarii informative cu reprezentanți ai autorităților locale, care vor asista în procesul de identificare și informare a proprietarilor privați de păduri cu privire la limitarea invaziei gândacului scoarțar al pinului.

Problema afectează în principal pădurile de conifere întemeiate artificial și este cauzată în primul rând de împădurirea acestora la altitudini mai joase decât arealul lor natural. Știința recomandă doar executarea tăierilor sanitare și obligatorii ca soluție, precum și îndepărtarea lemnului uscat infectat și deteriorat.

Arborii deteriorați și uscați reprezintă, de asemenea, o amenințare potențială pentru declanșarea incendiilor, în special în lunile de vară. Tăierea graduală a suprafețelor forestiere afectate trebuie efectuată cu grijă, fără modificări drastice ale mediului și fără a expune suprafețe goale.

Pentru a pune problema sub control, sunt necesare eforturi comune ale tuturor părților interesate, precum și înțelegerea publicului.

Gândacul scoarțar al pinului (*Ips acuminatus* Gyll.)

Este răspândit în întreaga Europă, Asia, America de Nord, precum și în țara noastră. Atacă în principal pinul silvestru – părțile superioare ale coroanei, ramurile mai groase și trunchiul. Galeriile materne și larvare întrerup țesuturile conducătoare și arborele moare într-o perioadă foarte scurtă de timp. Acele își pierd inițial culoarea, iar mai târziu capătă o culoare roșie caracteristică, motiv pentru care pădurile afectate sunt cunoscute sub numele de păduri roșii. Lemnul deteriorat este devalorizat, pierderile sunt enorme, iar ecosistemele forestiere își pierd funcțiile.

În condiții favorabile, gândacul scoarțar al pinului produce două generații pe an: aprilie – mai și iulie – august. Adultul iernează și primăvara creează orificii de ieșire rotunde și atacă arborii învecinați. Larvele se dezvoltă rapid în 20 – 25 de zile, iar în august a doua generație atacă arborii învecinați.

Schimbările climatice sunt principalul factor din spatele dezvoltării unei a doua generații în nordul Bulgariei.