

Proгноza meteorologică pentru a doua jumătate a lunii august

Автор(и): Растителна защита
Дата: 23.08.2017 Брой: 8/2017



Ca urmare a temperaturilor ridicate din prima jumătate a lunii august în regiunile sud-vestice ale țării (zona Petrich), recoltarea strugurilor pentru soiurile de vin alb Muscat Ottonel și Chardonnay a început mai devreme decât datele obișnuite.

În prima jumătate a perioadei, temperaturile prognozate peste normal vor accelera etapele finale de dezvoltare ale culturilor agricole târzii. La sfârșitul celei de-a doua decadă, se va observa maturitatea de ceară și cea completă la hibridii de porumb mijlociu-timpurii. Pe parcursul perioadei, la hibridii mijlociu-târzii va avea loc faza de lapte și trecerea la maturitatea de ceară, iar la hibridii târzii – umplerea bobului. La floarea-soarelui, în suprafețele cultivate va predomina maturitatea tehnică. La începutul celei de-a treia decadă, se va observa faza

de coacere la soia, începutul deschiderii căpsulelor la bumbac și faza de maturitate de lapte la orez. O parte din soiurile timpurii de struguri pentru vin alb din sudul Bulgariei vor intra în maturitate tehnologică.

Ca urmare a temperaturilor ridicate din prima jumătate a lunii august în regiunile sud-vestice ale țării (zona Petrich), recoltarea strugurilor pentru soiurile de vin alb Muscat Ottonel și Chardonnay a început mai devreme decât datele obișnuite.

În a doua jumătate a perioadei, se prognozează o scădere substanțială a temperaturilor și o schimbare a condițiilor agrometeorologice. Precipitațiile așteptate, întârziate pentru o parte din culturile de primăvară din regiunile estice și sudice ale țării, vor îmbunătăți starea hidrofizică a solului din stratul arabil, ceea ce este o premisă pentru executarea cu o calitate superioară a arăturii adânci și a pregătirii pre-semănat a suprafețelor destinate semănatului cu rapiță. În a treia decadă a lunii august, încep termenele agrotehnice pentru semănatul rapiței de toamnă.

Condiții favorabile pentru efectuarea recoltării floarea-soarelui, care a început punctual în sudul Bulgariei, vor apărea în prima jumătate a perioadei.

Sursa: INMH - BAN