

Septembrie este potrivit pentru recoltarea culturii.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 12.09.2017 Брой: 9/2017



La începutul lunii septembrie, vremea caldă prognozată, și în multe locuri din zonele de câmpie chiar caniculară, va accelera progresul etapelor finale de dezvoltare ale culturilor de câmp tardive. Până la mijlocul primei decade, hibridii de porumb semi-târzii vor atinge faza de coacere ceros-grumoasă și de coacere deplină, în timp ce hibridii târzii vor fi în faza lăptoasă și vor trece la coacerea ceros-grumoasă. Sfecla de zahăr va fi în majoritate la maturitatea tehnologică.

La mijlocul lunii, condițiile agrometeorologice vor suferi o schimbare. Se prognozează precipitații și o scădere a temperaturilor, alături de un risc crescut de dezvoltare a patogenilor care provoacă putregaiuri la producția de fructe și legume care se coc – putregaiul cenușiu la struguri (***Botrytis cinerea***), monilioza fructelor (***Monilia***

fructigena) la fructele soiurilor de pomi fructiferi de toamnă-iarnă, mana cartofului la roșii (**Phytophthora infestans**), etc. După scurtul răcoros din a doua decadă, se așteaptă din nou condiții termice peste normă. În această perioadă, hibridii târzii de porumb își vor finaliza dezvoltarea, iar orezul va atinge faza de coacere ceros-grumoasă și de coacere deplină. Spre sfârșitul decadei, bumbacul va intra în faza de maturare. Ca urmare a temperaturilor peste normă, soiurile mai târzii de struguri pentru vin roșu vor atinge maturitatea tehnologică mai devreme decât datele tipice, în a doua jumătate a lunii septembrie.

Pentru cea mai mare parte a celei de-a doua și a treia decade, se prognozează vreme relativ uscată, oferind condiții potrivite pentru desfășurarea activităților agrotehnice sezoniere, cum ar fi finalizarea recoltării floarea-soarelui, recoltarea porumbului, executarea arăturii adânci și a pregătirii solului pentru semănatul suprafețelor destinate culturilor de toamnă. Sfârșitul celei de-a doua decade a lunii septembrie este momentul optim pentru semănatul rapiței de toamnă. La sfârșitul lunii, în ogoarele mai înalte, încep termenele agrotehnice pentru semănatul cerealelor de toamnă.

Pe parcursul lunii septembrie, nu se prognozează temperaturi minime critice. Condițiile vor permite formarea unei producții suplimentare de la culturile tardive de legume sensibile la îngheț.

Sursa: INMH–AȘR