

La sfârșitul lunii septembrie vor exista condiții pentru dezvoltarea patogenilor în cultura de fructe coapte.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 22.09.2017 *Брой:* 9/2017



După vremea răcoroasă din primele zile de toamnă, se așteaptă o îmbunătățire treptată a condițiilor termice în perioada următoare. Precipitațiile de la începutul celei de-a treia decadă și precipitațiile prognozate în a doua jumătate a perioadei vor îmbunătăți conținutul de umiditate al solului din stratul arabil și condițiile pentru efectuarea lucrărilor sezoniere de pregătire a solului. Seceta adâncită de la sfârșitul verii a împiedicat serios executarea arăturilor adânci și a lucrărilor de pregătire pre-semănat a suprafețelor destinate semănării cu rapiță și culturi cerealiere de toamnă. Din aceste motive, se anticipează întârzieri în realizarea semănăturilor de toamnă viitoare. Termenele optime pentru semănatul rapiței de toamnă au expirat la sfârșitul celei de-a doua

decadă a lunii septembrie. În perioada următoare, vor începe termenele agrotehnice pentru semănarea culturilor cerealiere de toamnă în câmpiile înalte.

La sfârșitul lunii septembrie, hibrizii târzii de porumb își vor finaliza dezvoltarea. O mare parte din soiurile de struguri pentru vin roșu vor atinge maturitatea tehnologică, iar soiurile de pomi fructiferi de toamnă vor atinge maturitatea de cules. La începutul perioadei, nu sunt excluse înghețurile la sol în câmpiile înalte, ceea ce impune recoltarea promptă a culturilor tardive de legume sensibile la îngheț. Temperaturile și precipitațiile prognozate în ultimele zile ale perioadei vor crea condiții pentru dezvoltarea unor patogeni pe recolta de fructe coapte – mucegaiul cenușiu pe soiurile târzii de struguri și putregaiul brun tardiv pe fructele soiurilor de pomi fructiferi de toamnă.

Sursa: INMH - B.A.S.