

În octombrie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi și precipitații apropiate de normele climatice.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 06.10.2017 Брой: 10/2017



La începutul lunii se preconizează o întârziere a semănăturilor de toamnă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea activităților agrotehnice sezoniere va avea loc în a doua decadă a lunii octombrie. Pe parcursul celei mai mari părți a lunii, vegetația culturilor de toamnă va decurge într-un ritm moderat.

În primele zile ale lunii octombrie, dezvoltarea culturilor de toamnă semănate va decurge într-un ritm mai lent în condiții termice sub normale. În câmpurile mai înalte, se vor crea condiții pentru formarea înghețului, ceea ce va

impune recoltarea la timp a culturilor legumicole din producția târzie în câmp deschis (roșii, ardei) care sunt sensibile la îngheț. Precipitațiile prognozate în prima decadă a lunii vor întârzia și mai mult finalizarea semănăturii de rapiță de toamnă, implementarea lucrărilor de pregătire pre-semănat și semănarea culturilor de cereale de toamnă. După seceta de la sfârșitul verii, ploile însemnate de la începutul toamnei, care în multe părți ale țării au depășit 40 - 45 l/m² (Vrața - 69 l/m², Montana - 42 l/m², Loveci - 46 l/m², Plovdiv - 77 l/m², Pazardjik - 65 l/m², Kărdjali – 74 l/m², Elhovo – Cirpan - 45 l/m²), au provocat supra-umezirea straturilor superioare ale solului. Din aceste motive, se preconizează întârzieri în efectuarea lucrărilor de semănat toamna. În prima jumătate a lunii octombrie este perioada agrotehnică pentru semănatul grâului în Bulgaria de Nord, din 15 până în 25 octombrie - în Bulgaria de Sud, iar în a treia decadă - pentru regiunile de-a lungul litoralului Mării Negre.

Îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea activităților agrotehnice sezoniere este așteptată în a doua decadă a lunii octombrie.

Pe parcursul celei mai mari părți a lunii, vegetația culturilor de toamnă va decurge într-un ritm moderat. La sfârșitul lunii octombrie, la grâu și orz, în funcție de datele de semănat, se vor observa următoarele stadii: încolțire, a treia frunză și începutul încălțării la cerealele de toamnă semănate la sfârșitul lunii septembrie. La rapiță, va fi în curs formarea frunzelor. Cele mai timpurii culturi semănate, în a treia decadă a lunii august, vor atinge stadiul de formare a rozetei până la sfârșitul lunii octombrie.

În octombrie, precipitațiile frecvente și umiditatea atmosferică ridicată vor crește riscul de dezvoltare a unor boli la rapiță, patul frunzelor (*Leptosphaeria macularia*) și alternarioza (*Alternaria brassicae*), în stadiile inițiale ale vegetației acesteia. Pe parcursul lunii, trebuie monitorizată apariția și densitatea populației unor dăunători - puricele de varză și musca ferăstrăului de rapiță, care provoacă pagube serioase culturilor de rapiță toamna. Când densitatea dăunătorilor depășește pragul economic de dăunățitate, tratamentul este imperativ.

Sursa: INMH - BAN