

Fierăstrăul frunzelor de rapiță – *Anthalia rosae*

Автор(и): Растителна защита
Дата: 08.10.2017 Брой: 10/2017



Daune:

În toamnă se dezvoltă a treia generație a dăunătorului. Adulții de gărgărițe zboară până la sfârșitul lui octombrie și își depun ouăle pe cotiledoane și pe primele frunze adevărate. Larvele tinere se hrănesc pe partea inferioară a frunzelor, rozându-le sub formă de mici gropițe. Pe măsură ce cresc, rodeasc găuri în lamele frunzelor, care se măresc treptat,

provoacă daune periferice prin hrănire și mai târziu consumă întreaga lamă a frunzei, lăsând doar nervurile principale. După finalizarea dezvoltării, larvele se îngroapă în sol și rămân acolo pentru a ierna.

Lupta:

Lupta împotriva gărgăriței rapiticole se efectuează la un prag economic de 2–3 larve/m² sau 2–3 plante afectate/m².

Insekticide omologate pentru combatere:

Karate Zeon 5 CS – 15

ml/ha; Cytrin Max – 5 ml/ha, Decis 100 EC - 6.3 ml/ha, Dukat 25 EC - 20 ml/ha, Pirinex Supreme 3W - 60 ml/ha