

Gândacul de tulpină al rapiței – *Psylloides Chrysocephala*

Автор(и): Растителна защита
Дата: 10.10.2017 Брой: 10/2017



Daune:

Gândacul săritor al tulpinii de rapiță este răspândit peste tot și la

densități mari ale populației provoacă daune enorme. Dăunătorul dezvoltă o

generație pe an. Iernează sub formă de ou, larvă și insectă adultă.

În septembrie, adulții încep să se hrănească intensiv și de la sfârșitul lui septembrie până la mijlocul lui decembrie depun ouăle. Larvele eclozate inițial minează în epiderma tulpinilor, iar mai târziu în pețioluri și în

nervurile centrale ale frunzelor. O parte din larve ecozează primăvara.

O specie înrudită cu gândacul săritor al tulpinii de rapiță este Gândacul săritor mic al tulpinii de rapiță. Alte specii dăunătoare la rapița oleaginoasă sunt: gândacii săritori negri, cu picioare deschise, cu dungii ondulate, ai inului, ai cânepii și alte specii de gândaci săritori.

Combatere:

3 Combaterea chimică se aplică la un prag economic: 2 adulți/m² la urgență; 4 adulți/m² după apariția celei de-a 3-a frunze; 3–5 larve pe plantă.

Insecticide înregistrate pentru combatere:

Mavrik 2 F – 30 ml/da; Citrin Max – 5 ml/da; Deka EC – 30 ml/da; Decis 100 EC – 5 ml/da; Dukat 25 EC – 30 ml/da; Mageos – 5 g/da; Nurelle D – 60 ml/da; Pirinex Supreme 3V – 60 ml/da; Sherpa 100 EW – 25 ml/da.