

Proгноza meteorologică pentru luna noiembrie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 09.11.2017 Брой: 11/2017



În noiembrie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi în jurul și sub normele climatice. La începutul lunii noiembrie, condițiile termice sub normale prevăzute vor restricționa dezvoltarea culturilor semănate toamna. O creștere a temperaturilor și o activare a proceselor vegetației la grâu, orz și rapiță de toamnă este așteptată în a doua jumătate a primei decadă.

În majoritatea zilelor din prima și a doua decadă, vremea instabilă prevăzută, cu precipitații frecvente, va împiedica implementarea activităților agrotehnice sezoniere, dintre care cea mai importantă este finalizarea semănatului grâului. Precipitațiile căzute în ultima săptămână a lunii octombrie, care în multe părți ale țării au depășit normele lunare (Veliko Tărnovo – 60 l/m², Sviștov – 62 l/m², Kazanlăk – 75 l/m², Haskovo – 65 l/m², Stara Zagora – 60 l/m², Sliven – 74 l/m², Elhovo – 85 l/m², Karnobat – 210 l/m², Burgas – 92 l/m²), au fost

motivul pentru depășirea termenelor agrotehnice de semănat a culturilor de cereale de toamnă pe o parte din suprafețele de teren ale țării.

La începutul lunii noiembrie, condițiile termice sub normale prevăzute vor restricționa dezvoltarea culturilor semănate toamna. O creștere a temperaturilor și o activare a proceselor vegetației la grâu, orz și rapiță de toamnă este așteptată în a doua jumătate a primei decadă.

În a doua jumătate a lunii noiembrie, valorile prevăzute ale temperaturilor medii zilnice pentru Bulgaria de Nord vor fi în limite apropiate de minimul biologic necesar pentru dezvoltarea culturilor de cereale de toamnă. În câmpiile mai înalte și în Prebalcani, unde nu se exclude căderea de zăpadă, se va observa încetarea vegetației la culturile semănate toamna.

Condiții pentru vegetație la culturile de cereale de toamnă și rapița de toamnă în a doua jumătate a lunii vor fi create în principal în regiunile sudice ale țării și de-a lungul coastei Mării Negre.

La sfârșitul lunii noiembrie, la grâul și orzul semănate în octombrie, va predomina faza de încălțare. La culturile semănate în noiembrie, se vor observa încolțirea și faza inițială de formare a frunzelor. Semănatul culturilor de cereale de toamnă efectuat în noiembrie, după termenele agrotehnice, limitează posibilitățile ca culturile să intre în faza de încălțare până la sfârșitul vegetației lor de toamnă. În această fază, plantele au o rezistență crescută la frig, ceea ce asigură într-o mare măsură iernarea lor cu succes.

La sfârșitul lunii noiembrie, la rapița de toamnă semănată în termenul agrotehnic – în septembrie, se va observa faza de formare a rozetei (6–7 frunze). Pe parcursul lunii, nu sunt prevăzute temperaturi minime critice pentru culturile agricole.

În noiembrie, condiții mai potrivite pentru plantarea pomilor fructiferi vor apărea la sfârșitul primei, începutul celei de-a doua și în majoritatea zilelor celei de-a treia decadă.

Sursa: INMH-BAS