

# Activarea proceselor vegetative la culturile de toamnă semănate.

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 22.11.2017 Брой: 11/2017



Temperaturile ridicate de la începutul celei de-a doua decadă a lunii noiembrie, cu valori maxime atingând în unele locuri 19-20°C în Vrața, Pleven, Veliko Tărnovo, Varna, Elhovo, Sandanski, Kardjali, iar în zona Loveci până la 22°C, au activat procesele vegetative la culturile de toamnă semănate.

În cursul celei de-a doua decade a lunii noiembrie, dezvoltarea grâului, orzului și rapiței de toamnă în regiunile de câmpie ale țării va progresa la temperaturi în jurul și peste normele climatice pentru perioadă.

La sfârșitul celei de-a doua jumătăți a perioadei, se prognozează o răcire și o schimbare substanțială a condițiilor agrometeorologice. În câmpiile mai înalte, unde se așteaptă ninsoare, va avea loc o încetinire și

încetare a vegetației la culturile de toamnă. La începutul celei de-a treia decade a lunii noiembrie, în majoritatea regiunilor de câmpie ale țării, valorile prognozate ale temperaturilor medii zilnice nu vor depăși minimul biologic necesar pentru dezvoltarea grâului, orzului și rapiței de toamnă. La sfârșitul perioadei, în culturile de cereale de toamnă semănate în octombrie în termen agrotehnic, va predomina faza de încovoietoare. În culturile semănate în prima săptămână a lunii noiembrie, se vor observa fazele de încolțire și formare a frunzelor. La rapița de toamnă semănată la începutul toamnei, se va observa faza de rozetă (6-7 frunze).

În majoritatea părților țării, rezervele de apă din sol sunt foarte bune. Pe parcursul perioadei, precipitațiile așteptate vor spori rezervele de umiditate de toamnă din straturile de sol de 50 și 100 cm. În cea mai mare parte a țării acestea sunt foarte bune, cu niveluri peste 80-85% din capacitatea de câmp (CC).

*Sursa: INMH-BAS*