

Condiții potrivite pentru plantarea pomilor fructiferi

Автор(и): Растителна защита
Дата: 29.11.2017 Брой: 11/2017



Până la sfârșitul lunii, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi peste normal. În zonele de câmpie ale țării, valorile prognozate ale temperaturilor medii zilnice vor depăși semnificativ minimul biologic necesar pentru dezvoltarea grâului, orzului și rapiței de toamnă. Vremea blândă așteptată pentru acest sezon va prelungi vegetația de toamnă a culturilor de cereale de toamnă și a rapiței de toamnă și va fi o premisă pentru progresul în dezvoltarea culturilor întârziate semănate în noiembrie.

Declinul și încetarea vegetației la culturile de toamnă

Până pe 30 noiembrie se prognozează o scădere și normalizare a condițiilor de temperatură, ceea ce va duce la un declin și, în câmpurile mai înalte, la încetarea vegetației la culturile de toamnă. La sfârșitul celei de-a treia decadă, grâul și orzul semănate în termenul agrotehnic vor fi predominant în faza de încolțire. Faza celei de-a treia frunze va predomina la culturile semănate la începutul lui noiembrie, iar faza de încolțire la cele semănate la mijlocul lunii. În o mare parte a culturilor de rapiță se va observa faza de rozetă (6–7 frunze). În unele locuri din regiunile de sud-est (stațiunea agricolă Sliven) înălțimea culturilor de rapiță a atins 25–27 cm, iar rozeta – 7–8 frunze.

La sfârșitul lunii vor exista condiții favorabile pentru plantarea pomilor fructiferi și pentru efectuarea tratamentelor de protecție a plantelor de toamnă în livezi.

Sursa: INMH - BSA