

Proгноză agro-meteorologică pentru luna ianuarie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 08.01.2018 Брой: 1/2018



Anomaliile climatice de la începutul iernii, cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru sezon, au perturbat procesele de întărire la culturile semănate toamna și au provocat umflarea prematură a mugurilor la unele specii de pomi. În regiunile estice și sudice, neobișnuit pentru sezon, s-a observat înflorirea la unele flori de primăvară timpurie (ghiocel, păpădie) și la anumiți arbuști ornamentalți (forsythia). În majoritatea zilelor din ianuarie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi peste normele climatice, dar sub minimul biologic necesar pentru reluarea proceselor vegetative la grâu, orz și rapiță de toamnă. În ianuarie, condiții mai potrivite pentru tăierea culturilor pomicole vor apărea în a treia decadă, când se așteaptă vreme relativ uscată și blândă pentru sezon.

Temperaturile neobișnuit de ridicate de la începutul iernii (Vidin - 20°C, Vrața - 20°C, Montana - 22°C, Lovech - 20°C, Veliko Tărnovo - 19°C, Razgrad - 18°C, Varna - 18°C, Pazardjik – 18°C, Plovdiv - 20°C) au perturbat starea de repaus la o parte din culturile semănate toamna în regiunile arabile ale țării. După vremea neobișnuit de caldă pentru sezon, răcirea prognozată la mijlocul primei decade din ianuarie va împiedica vegetația nedorită la culturile de cereale de toamnă, ceea ce ar duce la reducerea rezistenței lor la ger.

În majoritatea zilelor din ianuarie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi peste normele climatice, dar sub minimul biologic necesar pentru reluarea proceselor vegetative la grâu, orz și rapiță de toamnă. Pe parcursul lunii, în majoritatea regiunilor arabile, culturile semănate toamna vor rămâne într-o stare de repaus. Excepții se vor observa în anumite localități de-a lungul coastei Mării Negre, în valea râului Struma și în regiunile cele mai sudice. În perioadele relativ calde, la începutul lunii și în a treia decadă, în aceste părți ale țării se vor crea condiții pentru o vegetație slab exprimată la grâu și orz, dar aceasta nu va duce la modificări în stadiile fenologice ale culturilor.

În ianuarie, temperaturile minime prognozate până la minus 13°C, în condiții fără strat de zăpadă și cu persistență mai îndelungată, vor prezenta un risc doar pentru culturile cele mai târziu semănate de orz și grâu, care vor ierna în stadiul de a doua–a treia frunză. Ca urmare a temperaturilor peste normă de la sfârșitul toamnei, culturile de cereale de toamnă și rapița au avansat în dezvoltare și o mare parte dintre ele au intrat în stadiuri potrivite pentru iernare. La grâu și orz, stadiul predominant este încălțarea, iar la rapiță – stadiul de rozetă (7–8–9 frunze).

Pe parcursul lunii, precipitațiile așteptate (în jurul și sub normă) vor spori rezervele de umiditate a solului și în stratul de doi metri. La sfârșitul toamnei, rezervele de umiditate a solului în stratul de un metru sub grâu în majoritatea regiunilor agricole erau foarte bune, cu niveluri peste 90% din capacitatea de câmp. Excepții s-au observat doar în anumite localități din Câmpia Dunării (stațiile agrometeorologice Kneja, Novacene) și în regiunile nord-estice ale țării.

În ianuarie, condiții mai potrivite pentru tăierea culturilor pomicele vor apărea în a treia decadă, când se așteaptă vreme relativ uscată și blândă pentru sezon.

Sursa: INMH-BAS