

Încârlarea la piersic

Автор(и): Растителна защита
Дата: 12.02.2019 Брой: 2/2019



Agent cauzal: *Taphrina deformans* – ciupercă

Gazde: piersic, nectarin, cais

Simptome:

Umflături simple sau multiple, de culoare verde-pal, galben-pal sau roșu-stacojiu pe partea superioară a frunzelor, care pe partea inferioară sunt adâncite. Țesuturile sunt dense, aspre și ondulate;

Afecțiunea poate afecta întreaga lamă foliară, drept urmare frunzele devin necrotice și cad.

Se formează un strat albicios pe țesuturile infectate;

Umflături se pot forma și pe lăstari și fructe.

Ciclul de viață

Agentul cauzal supraviețuiește iarna sub formă de ascospori între solzii mugurilor sau pe scoarța lăstarilor infectați. Infecțiile au loc la începutul primăverii, odată cu înflorirea mugurilor foliari.

Luptă:

Tratamente toamna-iarna. Dacă tratamentul de toamnă a fost omis, acesta poate fi efectuat până la umflarea mugurilor cu 1% Bordeaux, care este eficient și împotriva agenților cauzatori ai **arsurii florilor (putregaiul brun timpuriu) și găuririi frunzelor la sâmburioase**.