

Timp pentru pulverizarea pre-înflorire

Автор(и): Растителна защита
Дата: 12.03.2018 Брой: 3/2018



În a treia decadă a lunii martie începe primăvara calendaristică. Temperatura medie lunară crește de la 4-8°C, nebulozitatea scade, iar numărul de zile însorite crește. Ca urmare a încălzirii, se încheie faza de repaus forțat a speciilor pomicole, iar în același timp se activează activitatea vitală a unei serii de dăunători pe acestea. Vremea în martie este foarte schimbătoare, ceea ce impune pomicultorilor să monitorizeze zilele potrivite pentru lucrările în livezi.

Multe dintre formele de iernare ale dăunătorilor periculoși ai pomilor fructiferi își petrec iarna în sol, iar în frunzele căzute „pândesc” agenții patogeni ai bolilor, gata să atace. Prin urmare, livezile cultivate și curățate sunt o garanție pentru reducerea riscului de dăunători. Dacă până acum nu s-a efectuat stropitul de iarnă, acesta nu trebuie omis, deoarece distruge acarieni, afide și păduchi lăptoși.

Stropirile preflorale încep în martie. Prima este în faza „ureche de șoarece” la măr – împotriva făinării și tăii cu un fungicid, iar a doua – din nou împotriva aceluiași boli, dar cu includerea unui insecticid împotriva muscării mărului. La păr – împotriva tăii, muscării părului, psilei părului și ploșniței pătată. La cireș și vișin – împotriva putregaiului brun, găurii de glonț, arsurii bacteriene, gândacului cireș/vișin. Prune – muscăria prunului. Cais – putregai brun, gaură de glonț, molia ramurilor de piersic. Piersic – buclă frunzelor, molia ramurilor de piersic.

Stropirile preflorale ale pomilor fructiferi sunt o măsură responsabilă care nu trebuie omisă. Ele marchează începutul controlului chimic, iar acest început determină statutul fitosanitar în livadă pe tot parcursul sezonului.

Pentru controlul chimic în livadă și grădină – pentru calendarul tratamentelor și produsele potrivite, citiți numărul 2/2018 al revistei „Protecția Plantelor”.