

Luna lui Marte nu încetează să ne surprindă

Автор(и): Растителна защита
Дата: 26.03.2018 Брой: 3/2018



Evenimentele meteorologice de iarnă de la începutul lunii martie, la sfârșitul celei de-a doua și începutul celei de-a treia decadă, au cauzat într-o mare măsură pagube de îngheț speciilor cu sămbure (migdal, piersic, cais, cireș) care intraseră în faza de boboc de floare și înflorire în părți din regiunile de est și sud ale țării. Precipitațiile și topirea zăpezii din perioada următoare vor menține straturile superioare de sol suprasaturate cu apă și condițiile nepotrivite pentru desfășurarea activităților agrotehnice sezoniere. Din aceste motive, semănatul florii-soarelui în sudul Bulgariei va fi efectuat cu întârziere și dincolo de termenele agrotehnice.

Ultimele zile ale lunii martie vor fi caracterizate de o vreme rece pentru sezon. În multe părți ale țării sunt prevăzute căderi de zăpadă, temperaturi minime negative și pagube suplimentare de îngheț culturilor pomicole avansate în dezvoltare. Evenimentele meteorologice de iarnă de la începutul lunii martie, la sfârșitul celei de-a

doua și începutul celei de-a treia decadă, au cauzat într-o mare măsură pagube de îngheț speciilor cu sâmbure (migdal, piersic, cais, cireș) care intraseră în faza de boboc de floare și înflorire în părți din regiunile de est și sud ale țării.

În a doua jumătate a perioadei, se așteaptă o creștere semnificativă a temperaturilor și o schimbare a condițiilor agrometeorologice. În ultimele zile ale lunii martie, valorile prevăzute ale temperaturilor medii zilnice în majoritatea suprafețelor de câmp vor atinge și vor depăși minimul biologic necesar pentru reluarea și activarea proceselor de vegetație la culturile semănate toamna.

La sfârșitul lunii, stadiul de încovoietoare va predomina la cerealele de toamnă. Excepții se vor observa în locații individuale din Câmpia Traciei Superioare (Pazardjik, Plovdiv), unde grâul și orzul au intrat în stadiul de început al alungirii tulpinii în a doua decadă a lunii martie, mai devreme decât datele obișnuite.

Precipitațiile și topirea zăpezii din perioada următoare vor menține straturile superioare de sol suprasaturate cu apă și condițiile nepotrivite pentru desfășurarea activităților agrotehnice sezoniere. Din aceste motive, semănatul florii-soarelui în sudul Bulgariei va fi efectuat cu întârziere și dincolo de termenele agrotehnice.

Sursa: INMH